

# 成人のアレルギー性鼻炎における第2世代抗ヒスタミン薬院内フォーミュラリ

監修 耳鼻咽喉科 小嶋 康隆 部長代行  
 作成 薬剤部 森 良江  
 2022.4.12改訂 薬剤部 森 良江

## 眠気を気にする

※高齢者はふらつきなどで転倒を起こすことがあるため慎重投与

### 第一選択薬

**フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg** ← 症状軽い人, 眠気少ない  
 (先発品: アレグラ)

(46.6円/日) 2錠分2 朝・夕食後 ●  
 ・水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム含有製剤と併用注意

増量しても効果が乏しい  
 又は飲み忘れが多い

### デザレックス錠5mg

(51.7円/日) 1錠分1 ●●● 透析性×

### ピラノアOD錠20mg【院外専】

(61.9円/日) 1錠分1空腹時 ●●● (中等度・重度) 透析性×

※デザレックス、ピラノアの増量は承認されていない

鼻閉にも効果有り

### ディレグラ配合錠【院外専】

(153.2円/日) 4錠分2 朝・夕空腹時 ●●● 透析性×

- ・鼻閉症状が中等症以上の場合のみ
- ・2週間程度の最小限の期間に留めること
- ・水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム含有製剤と併用注意
- ・重度の高血圧、冠動脈疾患のある患者、閉塞隅角緑内障、尿閉、交感神経刺激薬による不眠、めまい、脱力、振戦、不整脈等の既往歴のある患者には禁忌。

フェキソフェジン30mg +  
 プソドエフェドリン  
 60mg (α刺激薬)  
 を配合

## 効果重視

### 第一選択薬

**オロパタジン塩酸塩OD錠5mg** ← 強力  
 (先発品: アレロック)

(21.0円/日) 2錠分2朝及び就寝前 ●●●● (劇症肝炎の報告あり) 透析性×

**ベポタスチンベシル酸塩錠10mg** ← オロパタジンよりマイルド  
 (先発品: タリオン)

(27.6円/日) 2錠分2朝・夕食後 ●●● 透析性○

飲み忘れが多い

**レボセチリジン塩酸塩錠5mg** ← 強力, ジルテックの光学異性体, 個人差が小さい, 食事の影響なし  
 (先発品: ザイザル)

(22.3円/日) 1錠分1就寝前 ●●●● 透析性×

**デザレックス錠5mg** ← クレチンの代謝活性物, 個人差が小さい, 食事の影響なし

(51.7円/日) 1錠分1 ●●● 透析性×

**ピラノアOD錠20mg【院外専】** ← 速く効いて強力 食事の影響あり

(61.9円/日) 1錠分1空腹時 ●●● (中等度・重度) 透析性×

※デザレックス、ピラノアの増量は承認されていない

鼻閉にも効果有り

**ルパフィン錠10mg【院外専】** ← 抗PAF作用を併せ持つ

(54.9円/日) 1錠分1 ●●●● 透析性×

## 腎機能障害時 (腎機能正常者と同じ投与量)

### アレジオン錠20mg

(44.2円/日) 1錠分1 ●●● 透析性×

### エバステルOD錠10mg

(64.2円/日) 1錠分1 ●●● 透析性×

### クラリチン錠10mg【院外専】

(50.2円/日) 1錠分1食後 ●●● 透析性×

※ ( ) 内は1日薬価  
 2022.4時点

- クレアチニンクリアランスによって投与量の調節が必要。
- 重度腎機能障害患者は禁忌。 ●●● 腎機能障害患者は慎重投与。
- 自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させない。
- 自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
- 肝機能障害患者は注意。

上記薬剤使用にも関わらず改善に乏しい場合、耳鼻咽喉科コンサルテーションを検討する。

病型、重症度をもとに用いる薬剤を選択すること。

また、抗ヒスタミン薬の有用性には個人差があるため、既存薬で効果が得られている場合にはこの限りではない。