

# 便秘症治療薬の院内フォーミュラリ

- 【便秘症治療の基本】
- 非刺激性下剤を毎日適量内服
  - 排便回数は2回/日～1回/日を目標に、便性を整えていく
  - 刺激性下剤はレスキューとしてのみ使用する（耐性の可能性）

機械的消化管閉塞又はその疑いがある患者

→ **消化器内科にコンサルト** 

※（ ）内は1日薬価  
2022. 4時点

腎機能

正常時

マグミット (¥34. 2～45. 6)  
(2歳以上の小児のみ) モビコール (¥150. 6)

効果なし

下記4薬剤と併用  
もしくは  
下記4薬剤への変更

eGFR<30またはCr>1. 5～2. 0、  
75歳以上の方は下記薬剤を考慮

腎機能障害時使用可

アミティーザ (¥221. 6)

水分分泌促進

- 1日2回食後服用
- 用量依存的に効果発揮
- 一包化○ (30日間)
- 粉碎×
- ※妊婦に禁忌
- ※投与初期に吐き気 (若年女性に多い)

若い人への使用は避ける

リンゼス (¥78. 7～157. 4)

水分分泌促進＋腹痛軽減

- 1日1回食前 1回1～2錠
- 腹痛を改善
- 一包化、粉碎×

効果あり  
下痢しやすいため食前

院外専  
ゲーフィス (¥200. 4)

水分分泌促進＋蠕動運動亢進

- 1日1回食前
- 腸の動きが悪い場合に使用可  
→刺激性下剤減らせる可能性あり
- 一包化、粉碎○
- ※重篤な肝障害に使用不可
- ※併用注意あり (P糖タンパク質阻害作用)

肝障害時使用不可、相互作用あり  
胆嚢切除患者にも使用可

モビコール (¥150. 6)

浸透圧性下剤

- 粉末を水に溶解し服用
- 最大6包まで増量可能  
→患者に合わせ調節出来る

調節しやすい  
溶解後の味の好みに個人差あり

レスキューとして使用

刺激性下剤：センノシド (¥5. 1～10. 2)、ピコスルファートナトリウム (¥81/本)

○漢方薬について ※エビデンスレベル、推奨度は低い

桃核承気湯

麻子仁丸

大建中湯

¥9. 9/包 (錠剤 3錠/包)

¥16. 5/包 (2. 5g/包)

¥22. 5/包 (2. 5g/包)