外科・消化器外科（膵癌）　　ＧＥＭ＋Ｓ－１

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)	day(15)
注射																			
	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定														
		① 30 分で																	
		後・ﾊﾞｯｸﾞｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注 3mg/100mL(ｶｲﾄﾘ	1 袋																
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1mL	2 A																
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定														
		② 30 分で																	
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶																
		★ 200mg ジェムザール注	1000 mg /m²																
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定														
		③ 全開で																	
		生理食塩液注 50mL	1 瓶																
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)																	時間未定
		① 30 分で																	
		後・ﾊﾞｯｸﾞｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注 3mg/100mL(ｶｲﾄﾘ	1 袋																
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1mL	2 A																
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)																	時間未定
		② 30 分で																	
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶																
		★ 200mg ジェムザール注	1000 mg /m²																
	6	DIV 点滴静注(サーフロー)																	時間未定
		③ 全開で																	
		生理食塩液注 50mL	1 瓶																
処方																			
	1				●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
		【般】妊禁)★T20 ｴｽﾜﾝﾀｲﾎｳ配合OD錠	4 錠 /m²																
		分2:朝夕食後約30分																	
	2				●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
		【般】妊禁)★T25 ｴｽﾜﾝﾀｲﾎｳ配合OD錠	4 錠 /m²																
		分2:朝夕食後約30分																	
ｺﾒﾝﾄ																			