消化器内科（胃癌）　　ＸＥＬＯＸ（胃癌）

分類	GpNo	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		① 30 分で																
		アロキシ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg/50mL	1 袋															
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1㎖	1 A															
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		② 120分で																
		5% ブドウ糖注 500mL	1 袋															
		後)★50mg/10mL オキサリプラチン注	130 mg /㎡															
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1㎖	1 A															
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		③ 全開で																
		生理食塩液注 50mL	1 瓶															
処方	1				●	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶
		妊禁)★ゼローダ錠 300mg	2000 mg /㎡															
		分2:朝夕食後約30分 夕食後から服用																
ｺﾒﾝﾄ																		