耳鼻いんこう科　　カルボプラチン＋５ＦＵ

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)
注射									
	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			10:00				
		10:00～12:00 2 時間で							
		後)200mL ソルデム3A輸液	1 袋						
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			12:00				
		10時間で							
		後)ソルデム3A輸液 500mL	1 袋						
		★1000mg/20mL 5-FU注	500 mg /Body						
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			22:00	22:00	22:00	22:00	22:00
		12 時間で							
		後)ソルデム3A輸液 500mL	1 袋						
		★1000mg/20mL 5-FU注	500 mg /Body						
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)				10:00	10:00	10:00	10:00
		12 時間で							
		後)ソルデム3A輸液 500mL	1 袋						
		★1000mg/20mL 5-FU注	500 mg /Body						
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定				
		10:30～11:00 側管から							
		アロキシ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg/50mL	1 袋						
	6	DIV 点滴静注(サーフロー)			11:00				
		11:00～11:30 側管から							
		生理食塩液注 50mL	1 瓶						
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1mL	2 A						
	7	DIV 点滴静注(サーフロー)				11:00	11:00		
		11:00～11:30 側管から							
		生理食塩液注 50mL	1 瓶						
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1mL	1 A						
	8	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定				
		11:30～13:30 側管から 2 時間で							
		生理食塩液注 500mL	1 袋						
		後)★ 50mg/5mL カルボプラチン注	5 mg /GFR+25						
処方									
	1				●				
		125mg イメンドカプセル 10:00	1 C						
		医師の指示通り							
	2				●	→	→	→	→
		20mg タケキャブ錠	1 錠						
		分1:朝食後約30分							
	1					●	→		
		80mg イメンドカプセル	1 C						
		分1:朝食後約30分							
コメント									