

消化器内科（大腸癌）

FOLFIRI

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定
		① 30 分で			
		アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1 袋		
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	2 A		
		ブスコパン注 20mg/1ml	1 A		
	2	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定
		① 前投薬と同時に開始 側管から 120分で			
		5% ブドウ糖注 250mL	1 瓶		
		後)★ 25mg レボホリナート注	200 mg /m ²		
	3	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定
		② 90 分で			
		後)ソルデム3A輸液 500mL	1 袋		
		後)★40mg/2mL イリノカン注	150 mg /m ²		
	4	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定
		③ 15 分で メインボラス投与			
	5% ブドウ糖注 50mL	1 瓶			
	★1000mg/20mL 5-FU注	400 mg /m ²			
5	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
	④ フラッシュ用				
	処置:生食注シリンジ「NP」10mL	1 筒			
6	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
	⑤ トレフューザポンプ合計140ml 46時間で				
	生理食塩液注 250mL	1 袋			
	★1000mg/20mL 5-FU注	2400 mg /m ²			
7	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
	⑥ ポートフラッシュ用				
	処置:生食注シリンジ「NP」10mL	2 筒			
処方 コメント					