外科・消化器外科（胃癌）　　Ｈｅｒｃｅｐｔｉｎ＋ＸＰ（初回）

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
注射																		
	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		① ルートキープ																
		生理食塩液注 50mL	1 瓶															
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		② 90 分で																
		生理食塩液注 250mL	1 袋															
		要時)★ 60mg ハーセプチン注	8 mg /kg															
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		③ 30 分で																
		アロキシ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg/50mL	1 袋															
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1mL	3 A															
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		④ 全量で500mLになるように調整 120分で																
		生理食塩液注 500mL	1 袋															
		後)★ 10mg/20mL シスプラチン注	80 mg /m²															
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		⑤ 全開で																
		生理食塩液注 50mL	1 瓶															
処方																		
	1				●	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶
		妊禁)★ゼローダ錠 300mg 夕より内服開始	2000 mg /m²															
		分2:朝夕食後約30分																
ｺﾒﾝﾄ																		