

外科・消化器外科（胆道癌）

GEM + CDDP

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)
注射						
	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	時間未定
		① 1 時間で				
		後)ソリューゲンF注 500mL(ウイーンF)	1 瓶			
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	時間未定
		② 15 分で				
		アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1 袋			
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	2 A			
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	時間未定
		③ 全量で500mLになるように調整 60 分で				
		生理食塩液注 500mL	1 袋			
		後)★10mg/20mL シスプラチン注	25 mg /m ²			
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	時間未定
		④ 30 分で				
		5% ブドウ糖注 250mL	1 瓶			
	★ 200mg ジェムザール注	1000 mg /m ²				
5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	時間未定	
	⑤ 1 時間で					
	後)ソリューゲンF注 500mL(ウイーンF)	1 瓶				
処方						
コメント						