

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(8)	day(15)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) メイン① 30分で ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml 生理食塩液注 100mL	1 A 1 瓶		時間未定					
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) メイン② 30分で 5%ブドウ糖注 100mL ★200mg ジェムザール注	1 瓶 1000 mg /m <sup>2</sup>		時間未定					
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) フラッシュ用 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定					
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) メイン① 4時間で 生理食塩液「フソー」1000mL(エアスタイク) ガスター注射液20mg(ファモチジン)	1 袋 1 A			09:00				
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) メイン② 3時間で 生理食塩液注 500mL	1 袋			13:00				
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) メイン③ 4時間で 生理食塩液「フソー」1000mL(エアスタイク) プリンペラン注 10mg/2ml	1 袋 1 A			16:00				
	7	DIV 点滴静注(サーフロー) メイン④ 4時間で 後)ノルデム3A輸液 500mL	1 袋			20:00				
	8	DIV 点滴静注(サーフロー) 側管① 30分で ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	2 A 1 袋			12:00				
	9	DIV 点滴静注(サーフロー) 側管② 1時間以上かけて マンニトールS注射液300mL	1 瓶			時間未定				
	10	DIV 点滴静注(サーフロー) 側管③ 150分で 全量で500mLになるように調製 生理食塩液注 500mL 後)★10mg/20mL シスプラチン注	1 袋 70 mg /m <sup>2</sup>			14:00				
	11	DIV 点滴静注(サーフロー) 側管④ 30分で 生理食塩液注 100mL ラシックス注 20mg/2ml	1 瓶 1 A			時間未定				
	12	DIV 点滴静注(サーフロー) メイン① 100ml/時 後)リューゲンF注 500mL(ウーソフ) 5時間で ガスター注射液20mg(ファモチジン) ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	1 瓶 1 A 2 A				09:00			

