消化器内科（胃癌）　　Ｈｅｒｃｅｐｔｉｎ＋ＸＰ　1／2

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		① ルートキープ																
		生理食塩液注 50mL	1 瓶															
		残りは②のあとフラッシュ																
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		② 側管から 90 分で																
		要時)★ 60mg ハーセプチン注	8 mg /kg															
		生理食塩液注 250mL	1 袋															
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		③ 側管から 30 分で																
		アロキシ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg/50mL	1 袋															
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1㎖	3 A															
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		④ 側管から 60 分で																
		後)ソルデム3A輸液 500mL	1 袋															
		ラシックス注 20mg/2㎖	0.5 A															
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		⑤ 側管から 120分で 全量で500mlになるように調製																
		後)★10mg/20mL シスプラチン注	80 mg /m²															
		生理食塩液注 500mL	1 袋															
	6	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		最後のルートフラッシュ用 全開で																
		生理食塩液注 50mL	1 瓶															
	7	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		6 時間で メインルートから																
		後)ソルデム1輸液 500mL	1 袋															
	8	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		6 時間で メインルートから																
		後)ソルデム1輸液 500mL	1 袋															

消化器内科（胃癌）　Ｈｅｒｃｅｐｔｉｎ＋ＸＰ　2／2

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
注射	9	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		６ 時間で メインルートから																
		後)ソルデム1輸液 500mL	1 袋															
	10	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	時間未定											
		８ 時間で メインルートから																
		後)ソルデム1輸液 500mL	1 袋															
	11	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	時間未定											
		８ 時間で メインルートから																
		後)ソルデム1輸液 500mL	1 袋															
	12	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	時間未定											
		８ 時間で メインルートから																
		後)ソルデム1輸液 500mL	1 袋															
	13	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	時間未定											
		側管から 12時間で																
		後)ソリューゲンF注 500mL(ヴィーンF)	1 瓶															
	14	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	時間未定											
		側管から 12時間で																
		後)ソリューゲンF注 500mL(ヴィーンF)	1 瓶															
処方																		
	1				●	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶
		妊禁)★ゼローダ錠 300mg	2000 mg /m²															
		分2:朝夕食後約30分 夕食後から服用																
ｺﾒﾝﾄ																		