外科・消化器外科（胆道癌）　　ＧＥＭ＋ＣＤＤＰ＋ＴＳ－１

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
注射											
	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定						
		① 1 時間で									
		後)ソリューゲンF注 500mL(ヴィーンF)	1 瓶								
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定						
		② 15 分で									
		アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1 袋								
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1mL	2 A								
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定						
		③ 全量で500mLになるように調整 60 分で									
		生理食塩液注 500mL	1 袋								
		後)★10mg/20mL シスプラチン注	25 mg /m²								
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定						
		④ 30 分で									
		5% ブドウ糖注 250mL	1 瓶								
		★ 200mg ジェムザール注	1000 mg /m²								
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定						
		⑤ 1 時間で									
		後)ソリューゲンF注 500mL(ヴィーンF)	1 瓶								
処方											
	1				●	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶
		【般】妊禁)★T20 エスワンタイホウ配合OD錠	4 錠 /m²								
		【般】妊禁)★T25 エスワンタイホウ配合OD錠	4 錠 /m²								
		分2:朝夕食後約30分									
コメント											