

消化器内科 (大腸癌) FOLFIRI + Cet (2回目以降) 1/2

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)
注射	1	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
		① 30 分で				
		アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1 袋			
		★オルガドロノ注 5mg(成分3.8mg)/1ml	2 A			
		ポララミン注 5mg/1ml	1 A			
		ブスコピン注 20mg/1ml	1 A			
	2	IVH 埋込型カテーテルによるIVH				時間未定
		② ④ アービタックスの前後で				
		生理食塩液注 50mL	1 瓶			
		後の生食はアービタックスと同じ速度で				
	3	IVH 埋込型カテーテルによるIVH				時間未定
		③ 60 分で				
		生理食塩液注 250mL	1 袋			
		要時★アービタックス注 100mg/20mL	250 mg /m <sup>2</sup>			
	4	IVH 埋込型カテーテルによるIVH				時間未定
		⑤ 側管から 120分で				
	5% ブドウ糖注 250mL	1 瓶				
	後)★ 25mg レボホリナート注	200 mg /m <sup>2</sup>				
5	IVH 埋込型カテーテルによるIVH				時間未定	
	⑥ 90 分で					
	後)ソルデム3A輸液 500mL	1 袋				
	後)★40mg/2mL ｲﾝﾌｶﾝ注	150 mg /m <sup>2</sup>				
6	IVH 埋込型カテーテルによるIVH				時間未定	
	⑦ 15 分で					
	5% ブドウ糖注 50mL	1 瓶				
	★1000mg/20mL 5-FU注	400 mg /m <sup>2</sup>				
7	IVH 埋込型カテーテルによるIVH				時間未定	
	⑧ フラッシュ用					
	処置生食注ソソグ「NP」10mL	1 筒				
8	IVH 埋込型カテーテルによるIVH				時間未定	
	⑨ トレフューザポンプ合計140ml 46時間で					
	生理食塩液注 250mL	1 袋				
	★1000mg/20mL 5-FU注	2400 mg /m <sup>2</sup>				

消化器内科 (大腸癌) FOLFIRI + Cet (2回目以降) 2/2

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)
注射	9	IVH 埋込型カテーテルによるIVH ③ ポートフラッシュ用 処置:生食注シリンジ NPJ10mL	2 筒		時間未定	
	10	IVH 埋込型カテーテルによるIVH ① 30 分で 生理食塩液注 100mL ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml ボララミン注 5mg/1ml	1 瓶 2 A 1 A		時間未定	
	11	IVH 埋込型カテーテルによるIVH ② ④ アービタックスの前後で 後の生食はアービタックスと同じ速度で 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定	
	12	IVH 埋込型カテーテルによるIVH ③ 60 分で 生理食塩液注 250mL 要時)★アービタックス注 100mg/20mL	1 袋 250 mg /m <sup>2</sup>		時間未定	
	13	IVH 埋込型カテーテルによるIVH ⑤ ポートフラッシュ用 処置:生食注シリンジ NPJ10mL	2 筒		時間未定	
	処方					
	コメント					