

消化器内科（胃癌）

S-1 + CDDP 2/2

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(19)	day(20)	day(21)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) 側管から 15分で アロキシ点点滴静注バッグ 0.75mg/50mL ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ad	1袋 3A				
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) 全量で500mlになるように調製 側管から 120分で 生理食塩液注 500mL 後)★10mg/20mL シスプラチン注	1袋 60 mg /m ²				
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) 側管から 60分で 後)リルデム3A輸液 500mL ラシックス注 20mg/2ad	1袋 0.5 A				
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) 6時間で メインレートから 後)リルデム1輸液 500mL	1袋				
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) 6時間で メインレートから 後)リルデム1輸液 500mL	1袋				
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) 6時間で メインレートから 後)リルデム1輸液 500mL	1袋				
	7	DIV 点滴静注(サーフロー) 8時間で メインレートから 後)リルデム1輸液 500mL	1袋				
	8	DIV 点滴静注(サーフロー) 8時間で メインレートから 後)リルデム1輸液 500mL	1袋				
	9	DIV 点滴静注(サーフロー) 8時間で メインレートから 後)リルデム1輸液 500mL	1袋				
	10	DIV 点滴静注(サーフロー) 側管から 12時間で 後)リニューゲンF注 500mL(ウイーンF)	1瓶				
	11	DIV 点滴静注(サーフロー) 側管から 12時間で 後)リニューゲンF注 500mL(ウイーンF)	1瓶				
処方	1				→	→	→
		【脱】妊薬)★T20 エスワクイネリ配合OD錠	4錠 /m ²				
		【脱】妊薬)★T25 エスワクイネリ配合OD錠	4錠 /m ²				
コメント		分2:朝夕食後約30分					