

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) ① 30 分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	1 袋 2 A		時間未定		
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 30 分で フィルター禁忌 生理食塩液注 100mL 要時)★アブラキサン注 100mg	1 瓶 125 mg /m ²		時間未定		
	3	IV 静脈内注射 ③ フラッシュ用 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定		
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ④ 30 分で 5% ブドウ糖注 100mL ★ 200mg ジェムザール注	1 瓶 1000 mg /m ²		時間未定		
	5	IV 静脈内注射 ⑤ 全開で 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定		
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) ① 30 分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	1 袋 2 A		時間未定		
	7	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 30 分で フィルター禁忌 生理食塩液注 100mL 要時)★アブラキサン注 100mg	1 瓶 125 mg /m ²		時間未定		
	8	IV 静脈内注射 ③ フラッシュ用 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定		
	9	DIV 点滴静注(サーフロー) ④ 30 分で 5% ブドウ糖注 100mL ★ 200mg ジェムザール注	1 瓶 1000 mg /m ²		時間未定		

消化器内科（膵癌）

GEM+アブラキサン 2/2

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
注射	10	IV 静脈内注射				時間未定	
		⑤ 全開で					
		生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	11	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定
		① 30 分で					
		アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1 袋				
		★オルガドロ注 5mg(成分3.8mg)/1mL	2 A				
	12	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定
		② 30 分で フィルター禁忌					
		生理食塩液注 100mL	1 瓶				
		要時)★アブラキサン注 100mg	125 mg /m ²				
	13	IV 静脈内注射					時間未定
		③ フラッシュ用					
		生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	14	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定
	④ 30 分で						
	5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶					
	★ 200mg ジェムザール注	1000 mg /m ²					
15	IV 静脈内注射					時間未定	
	⑤ 全開で						
	生理食塩液注 50mL	1 瓶					
処方							
コメント							