

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	
注射	1	DIY 点滴静注(サーフロー) 09:00~13:00 5%ブドウ糖注 250mL	1 瓶		09:00				
	2	DIY 点滴静注(サーフロー) 13:00~翌13:00 生理食塩液「フソー」1000mL(エアレスタイフ) ★1000mg/20mL 5-FU注	1 袋 1000 mg /m ²		13:00	13:00	13:00	13:00	
	3	DIY 点滴静注(サーフロー) 9:00~9:30 側管から アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1mL ボララミン注 5mg/1mL	1 袋 2 A 1 A		09:00				
	4	IV 静脈内注射 10:00~11:00 側管から 生理食塩液注 250mL 要時★アーピタックス注 100mg/20mL	1 袋 250 mg /m ²		10:00				
	5	DIY 点滴静注(サーフロー) 11:00~11:12 側管から アーピタックスと同じ速度で点滴 生理食塩液注 50mL	1 瓶		11:00				
	6	DIY 点滴静注(サーフロー) 12:00~13:00 側管から 5%ブドウ糖注 250mL 後)★50mg/5mL カルボウラチン注	1 瓶 5 mg /GFR+25		12:00				
	7	DIY 点滴静注(サーフロー) 10:00~10:30 側管から 生理食塩液注 50mL ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1mL プリンペラン注 10mg/2mL	1 瓶 1 A 2 A			10:00	10:00	10:00	
	処方	1	125mg イメンドカプセル 医師の指示通り 10:30に	1 C		●			
		2	20mg タケキャブ錠 分1:朝食後約30分	1 錠		●	→	→	→
	処方	1	80mg イメンドカプセル 分1:朝食後約30分	1 C			●	→	
コメント									