

外科・消化器外科（膵癌） GEM+アブラキサン 1/2

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		① 30 分で					
		アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1 袋				
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	2 A				
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		② 30 分で フィルター禁忌					
		生理食塩液注 100mL	1 瓶				
		要時)★アブラキサン注 100mg	125 mg /m ²				
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		③ フラッシュ用					
		生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		④ 30 分で					
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶				
		★ 200mg ジェムザール注	1000 mg /m ²				
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		⑤ 全開で					
		生理食塩液注 50mL	1 瓶				
6	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定		
	① 30 分で						
	アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1 袋					
	★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	2 A					
7	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定		
	② 30 分で フィルター禁忌						
	生理食塩液注 100mL	1 瓶					
	要時)★アブラキサン注 100mg	125 mg /m ²					
8	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定		
	③ フラッシュ用						
	生理食塩液注 50mL	1 瓶					
9	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定		
	④ 30 分で						
	5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶					
	★ 200mg ジェムザール注	1000 mg /m ²					

外科・消化器外科（膵癌） GEM+アブラキサン 2/2

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
注射	10	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
		⑤ 全開で					
		生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	11	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
		① 30 分で					
		アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1 袋				
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	2 A				
	12	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定
		② 30 分で フィルター禁忌					
		生理食塩液注 100mL	1 瓶				
		要時)★アブラキサン注 100mg	125 mg /m ²				
	13	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定
		③ フラッシュ用					
		生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	14	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定
	④ 30 分で						
	5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶					
	★ 200mg ジェムザール注	1000 mg /m ²					
15	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定	
	⑤ 全開で						
	生理食塩液注 50mL	1 瓶					
処方 コメント							