外科・消化器外科（大腸癌）　　４週毎ＩＲＩＳ＋Ｂｅｖ

分類	GpNo	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)	day(15)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定														
		① 30 分で																	
		アロキシ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg/50mL	1 袋																
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1mL	2 A																
		ブスコパン注 20mg/1mL	1 A																
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定														
		② 全量で100mLになるように調整 初回90分　2回目60分　3回目30分																	
		生理食塩液注 100mL	1 瓶																
		★100mg/4mL アバスチン注	5 mg /kg																
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定														
		③ ⑤ カンプトの前後でフラッシュ																	
		生理食塩液注 100mL	1 瓶																
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定														
		④ 90 分で																	
		後)ソルデム3A輸液 500mL	1 袋																
		後)★40mg/2mL イリノテカン注	100 mg /m²																
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)																	時間未定
		① 30 分で																	
		アロキシ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg/50mL	1 袋																
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1mL	2 A																
		ブスコパン注 20mg/1mL	1 A																
	6	DIV 点滴静注(サーフロー)																	時間未定
		② 全量で100mLになるように調整 初回90分　2回目60分　3回目30分																	
		生理食塩液注 100mL	1 瓶																
		★100mg/4mL アバスチン注	5 mg /kg																
	7	DIV 点滴静注(サーフロー)																	時間未定
		③ ⑤ カンプトの前後でフラッシュ																	
		生理食塩液注 100mL	1 瓶																
	8	DIV 点滴静注(サーフロー)																	時間未定
		④ 90 分で																	
		後)ソルデム3A輸液 500mL	1 袋																
		後)★40mg/2mL イリノテカン注	100 mg /m²																
処方	1				●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
		【般】妊禁)★T25 エヌワンタイホウ配合OD錠	4 錠 /m²																
		【般】妊禁)★T20 エヌワンタイホウ配合OD錠	4 錠 /m²																
		分2:朝夕食後約30分																	
コメント																			