

外科・消化器外科（大腸癌） FOLFIRI + Cet （2回目以降） 1/2

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)
注射	1	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
		① 30 分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml ボララミン注 5mg/1ml ブスコパン注 20mg/1ml	1 袋 2 A 1 A 1 A			
	2	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
		② ④ アービタックスの前後で 生理食塩液注 50mL 後の生食はアービタックスと同じ速度で	1 瓶			
	3	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
		③ 60 分で 生理食塩液注 250mL 要時★アービタックス注 100mg/20mL	1 袋 250 mg /m ²			
	4	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
		⑤ 側管から 120分で 5% ブドウ糖注 250mL 後★ 25mg レボホリナート注	1 瓶 200 mg /m ²			
	5	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
		⑤ 90 分で 後)ソルデム3A輸液 500mL 後★40mg/2mL ｲﾝﾌﾟｶﾝ注	1 袋 150 mg /m ²			
	6	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
		⑥ 15 分で 5% ブドウ糖注 50mL ★1000mg/20mL 5-FU注	1 瓶 400 mg /m ²			
	7	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
		⑦ フラッシュ用 処置:生食注ｼﾝｼﾞｱNPJ10mL	1 筒			
	8	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
		⑧ トレフューザポンプ合計140ml 46時間で 生理食塩液注 250mL ★1000mg/20mL 5-FU注	1 袋 2400 mg /m ²			

外科・消化器外科（大腸癌） FOLFIRI + Cet （2回目以降） 2/2

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)
注射	9	IVH 埋込型カテーテルによるIVH ③ ポートフラッシュ用 処置:生食注シリンジ「NP」10mL	2 筒		時間未定	
	10	IVH 埋込型カテーテルによるIVH ① 30 分で 生理食塩液注 100mL ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml ポララミン注 5mg/1ml	1 瓶 2 A 1 A		時間未定	
	11	IVH 埋込型カテーテルによるIVH ② ④ アービタックスの前後で 後の生食はアービタックスと同じ速度で 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定	
	12	IVH 埋込型カテーテルによるIVH ③ 60 分で 生理食塩液注 250mL 要時)★アービタックス注 100mg/20mL	1 袋 250 mg /m ²		時間未定	
	13	IVH 埋込型カテーテルによるIVH ⑤ ポートフラッシュ用 処置:生食注シリンジ「NP」10mL	2 筒		時間未定	
	処方					
	コメント					