

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		① 15 分で 生理食塩液注 100mL ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml ガスター注射液20mg(ファモチジン) ポララミン注 5mg/1ml	1 瓶 2 A 1 A 1 A				
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		② 30 分で 後・バック)グラネセトン点滴静注 3mg/100mL(カイト)	1 袋				
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		③ ④ サイラムザの前後でフラッシュ 生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		④ 60 分で 生理食塩液注 250mL 要時)★100mg/10mL サイラムザ注 フィルター使用	1 袋 8 mg /kg				
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		⑤ 60 分で 5%ブドウ糖注 250mL 後)★30mg/5mL ハウタキセル注(ホスピール)	1 瓶 80 mg /m ²				
	6	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		⑥ 全開で 生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	7	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		① 15 分で 生理食塩液注 100mL ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml ガスター注射液20mg(ファモチジン) ポララミン注 5mg/1ml	1 瓶 2 A 1 A 1 A				
	8	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		② 30 分で 後・バック)グラネセトン点滴静注 3mg/100mL(カイト)	1 袋				

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
注射	9	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定
		③ 60 分で					
		5% ブドウ糖注 250mL	1 瓶				
		後)★30mg/5mL パツリタキセル注[ホスピール]	80 mg /m ²				
	10	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定
		④ 全開で					
		生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	11	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定
		① 15 分で					
		生理食塩液注 100mL	1 瓶				
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	2 A				
		ガスター注射液20mg(ファモチジン)	1 A				
		ポララミン注 5mg/1ml	1 A				
	12	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定
		② 30 分で					
		後・パツク)ケラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイト)	1 袋				
13	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定	
	③ ⑤ サイラムザの前後でフラッシュ						
	生理食塩液注 50mL	1 瓶					
14	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定	
	④ 60 分で フィルター必要						
	生理食塩液注 250mL	1 袋					
	要時)★100mg/10mL サイラムザ注	8 mg /kg					
15	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定	
	⑥ 60 分で フィルター必要						
	5% ブドウ糖注 250mL	1 瓶					
	後)★30mg/5mL パツリタキセル注[ホスピール]	80 mg /m ²					
16	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定	
	⑦ 全開で						
	生理食塩液注 50mL	1 瓶					
処方 コメント							