

## 産婦人科

## GD (GEM + DTX)

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)
注射	✂					
	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		① 30 分で				
		後・バック)グラニセロン点滴静注 3mg/100mL(カイト)	1 袋			
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	2 A			
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		② 30 分で				
		★ 200mg ジェムザール注	800 mg /m <sup>2</sup>			
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶			
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		③ 全開で				
		生理食塩液注 50mL	1 瓶			
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		① 30 分で				
		後・バック)グラニセロン点滴静注 3mg/100mL(カイト)	1 袋			
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	2 A			
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		② 60 分で				
		後)★20mg/1mLドセタキセル注	70 mg /m <sup>2</sup>			
		5% ブドウ糖注 250mL	1 瓶			
	6	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		③ 30 分で				
		★ 200mg ジェムザール注	800 mg /m <sup>2</sup>			
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶			
	7	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		④ 全開で				
		生理食塩液注 50mL	1 瓶			
	処方					
コメント						