消化器内科（大腸癌）　　ＳＯＸ＋Ｂｅｖ

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		① 30 分で																
		アロキシ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg/50mL	1 袋															
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1mL	1 A															
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		② 120分で																
		5% ブドウ糖注 500mL	1 袋															
		後)★50mg/10mL オキサリプラチン注	130 mg /m²															
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1mL	1 A															
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		③ ⑤ アバスチン前後で																
		生理食塩液注 50mL	1 瓶															
	4	DIV 点滴静注(翼状針)			時間未定													
		④ 初回90分　2回目60分　3回目30分																
		生理食塩液注 100mL	1 瓶															
		全量で100mlになるように調整																
		★100mg/4mL アバスチン注	7.5 mg /kg															
処方	1				●	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶
		【般】妊禁)★T25 エスワンタイホウ配合OD錠	4 錠 /m²															
		【般】妊禁)★T20 エスワンタイホウ配合OD錠	4 錠 /m²															
		分2:朝夕食後約30分																
ｺﾒﾝﾄ																		