

外科・消化器外科（乳癌） アバスチン＋タキソール 1/2

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		① 15 分で 生理食塩液注 100mL ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml ガスター注射液20mg(ファモチジン) ポララミン注 5mg/1ml	1 瓶 2 A 1 A 1 A				
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		② 30 分で 後・バックグラネセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイト)	1 袋				
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		③ 60 分で フィルター必要 5% ブドウ糖注 250mL 後)★30mg/5mL パツリタキセル注「ホスピール」	1 瓶 90 mg /m ²				
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		④ アバスチン前後でフラッシュ 生理食塩液注 100mL	1 瓶				
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		⑤ 全量で100mLになるように調製 生理食塩液注 100mL 30分で(初回は90分、2回目は60分) ★100mg/4mL アバスチン注	1 瓶 10 mg /kg				
	6	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		① 15 分で 生理食塩液注 100mL ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml ガスター注射液20mg(ファモチジン) ポララミン注 5mg/1ml	1 瓶 2 A 1 A 1 A				
	7	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		② 30 分で 後・バックグラネセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイト)	1 袋				
	8	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		③ 60 分で フィルター必要 5% ブドウ糖注 250mL 後)★30mg/5mL パツリタキセル注「ホスピール」	1 瓶 90 mg /m ²				

外科・消化器外科（乳癌） アバスチン+タキソール 2/2

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
注射	9	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
		④ フラッシュ用					
		生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	10	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
		① 15 分で					
		生理食塩液注 100mL	1 瓶				
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1mL	2 A				
		ガスター注射液20mg(ファモチジン)	1 A				
		ポララミン注 5mg/1mL	1 A				
	11	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
		② 30 分で					
		後・バック)グラネセロン点滴静注 3mg/100mL(カイト)	1 袋				
	12	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
		③ 60 分で フィルター必要					
	5%ブドウ糖注 250mL	1 瓶					
	後)★30mg/5mL ハウリタキセル注「ホスピール」	90 mg /m ²					
13	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定		
	④ アバスチン前後でフラッシュ						
	生理食塩液注 100mL	1 瓶					
14	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定		
	⑤ 全量で100mLになるように調製						
	生理食塩液注 100mL	1 瓶					
	30分で(初回は90分、2回目は60分)						
	★100mg/4mL アバスチン注	10 mg /kg					
処方							
コメント							