

外科・消化器外科（大腸癌）

FOLFI RI

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	IVH 埋込型カテーテルによるIVH ① 30 分で パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タイホウ」 ★オルガトロン注 3.8mg/1mL ブスコパン注 20mg/1ml	1 袋 2 A 1 A		時間未定
	2	IVH 埋込型カテーテルによるIVH ① 前投薬と同時に開始 側管から 120分で 5%トウ糖注 250mL(袋)(10/26～) ★25mg レボリナート注	1 袋 200 mg /m ²		時間未定
	3	IVH 埋込型カテーテルによるIVH ② 90 分で ソルテム3A輸液 500mL ★40mg/2mL イリノケン注 NKJ	1 袋 150 mg /m ²		時間未定
	4	IVH 埋込型カテーテルによるIVH ③ 15 分で メインポーラス投与 5% ブドウ糖注 50mL ★1000mg/20mL 5-FU注	1 瓶 400 mg /m ²		時間未定
	5	IVH 埋込型カテーテルによるIVH ④ フラッシュ用 処置)生食注シリシテNP」10mL	1 筒		時間未定
	6	IVH 埋込型カテーテルによるIVH ⑤ トレフューザポンプ合計140ml 46時間で 生理食塩液注 250mL ★1000mg/20mL 5-FU注	1 袋 2400 mg /m ²		時間未定
	7	IVH 埋込型カテーテルによるIVH ⑥ ポートフラッシュ用 処置)生食注シリシテNP」10mL	2 筒		時間未定
処方 コメント					