# 外科・消化器外科（胃癌）　　Ｓ－１＋Ｄｏｃｅｔａｘｅｌ

| 分類 | GpNo. | 薬剤／手技 | 投与量 | 点滴時間・速度 | day(1) | day(2) | day(3) | day(4) | day(5) | day(6) | day(7) | day(8) | day(9) | day(10) | day(11) | day(12) | day(13) | day(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注射 | 1 | DIV　点滴静注(サーフロー) | | | 時間未定 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ①<br>30　分で | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 後・ﾊﾞｯｸﾞｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注<br>3mg/100mL(ｶｲﾄﾘ | 1 袋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1mL | 2 A | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | DIV　点滴静注(サーフロー) | | | 時間未定 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ②<br>60　分で | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5% ブドウ糖注 250mL | 1 瓶 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 後)★20mg/1mL ドセタキセル注 | 40 mg /m² | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | DIV　点滴静注(サーフロー) | | | 時間未定 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ③<br>全開で | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 生理食塩液注　50mL | 1 瓶 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 処方 | 1 | | | | ● | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
| | | 【般】妊禁)★T20 ｴｽﾜﾝﾀｲﾎｳ配合OD錠 | 4 錠 /m² | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 分2:朝夕食後約30分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | ● | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
| | | 【般】妊禁)★T25 ｴｽﾜﾝﾀｲﾎｳ配合OD錠 | 4 錠 /m² | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 分2:朝夕食後約30分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ｺﾒﾝﾄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |