

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		① 15 分で 生理食塩液注 100mL ★オルカトロン注 3.8mg/1mL ファミチン注射液 20mg/2mL「トロー」(カスター) ポラミン注 5mg/1mL	1 瓶 2 A 1 A 1 A				
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		② 30 分で バックグラニセロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋				
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		③ ⑤ サイラムザの前後でフラッシュ 生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		④ フィルター必要 60 分で 忍容性良好なら30分で 生理食塩液注 250mL	1 袋				
		★100mg/10mL サイラムザ注	8 mg /kg				
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		⑥ 60 分で フィルター必要 5%のり糖注 250mL(袋)(10/26~)	1 袋				
		★30mg/5mL バクシセリン注「ホスピーラ」	80 mg /m ²				
	6	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		⑦ 全開で 生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	7	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
		① 15 分で 生理食塩液注 100mL ★オルカトロン注 3.8mg/1mL ファミチン注射液 20mg/2mL「トロー」(カスター) ポラミン注 5mg/1mL	1 瓶 2 A 1 A 1 A				
	8	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
		② 30 分で バックグラニセロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋				

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
注射	9	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定
		③ 60 分で フィルター必要					
		5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~)	1 袋				
		★30mg/5mL ハクシタキセル注[ホスピール]	80 mg /m ²				
	10	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定
		④ 全開で					
		生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	11	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定
		① 15 分で					
		生理食塩液注 100mL	1 瓶				
		★オルカトロン注 3.8mg/1mL	2 A				
		ファミシジ注注射液 20mg/2mL[トローワ](カスター)	1 A				
		ポララミン注 5mg/1mL	1 A				
	12	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定
		② 30 分で					
		バックグラニセロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋				
13	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定	
	③ ⑤ サイラムザの前後でフラッシュ						
	生理食塩液注 50mL	1 瓶					
14	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定	
	④ フィルター必要 60 分で 忍容性良好なら30分で						
	生理食塩液注 250mL	1 袋					
	★100mg/10mL サイラムザ注	8 mg /kg					
15	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定	
	⑥ 60 分で フィルター必要						
	5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~)	1 袋					
	★30mg/5mL ハクシタキセル注[ホスピール]	80 mg /m ²					
16	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定	
	⑦ 全開で						
	生理食塩液注 50mL	1 瓶					
処方							
コメント							