

| 分類 | GpNo. | 薬剤/手技 | 投与量 | 点滴時間・速度 | day(1) | |
|----|------------|---|-------------------------------|---------|--------|--|
| 注射 | 1 | IVH 埋込型カテーテルによるIVH ① 30分で パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タイボウ」 ★オルガトロン注 3.8mg/1mL | 1袋 2A | | 時間未定 | |
| | 2 | IVH 埋込型カテーテルによるIVH ② 側管から 120分で 5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26～) ★25mg リボリナート注 | 1袋 200 mg /m ² | | 時間未定 | |
| | 3 | IVH 埋込型カテーテルによるIVH ② 120分で 5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26～) ★50mg/10mL オキサフルオピラジン注 | 1袋 85 mg /m ² | | 時間未定 | |
| | 4 | IVH 埋込型カテーテルによるIVH ③ 15分で メインボラス投与 5%ブドウ糖注 50mL ★1000mg/20mL 5-FU注 | 1瓶 400 mg /m ² | | 時間未定 | |
| | 5 | IVH 埋込型カテーテルによるIVH ④ フラッシュ用 処置)生食注シリンジ「NP」10mL | 1筒 | | 時間未定 | |
| | 6 | IVH 埋込型カテーテルによるIVH ⑤ トレフューザポンプ合計140ml 46時間で 生理食塩液注 250mL ★1000mg/20mL 5-FU注 | 1袋 2400 mg /m ² | | 時間未定 | |
| | 7 | IVH 埋込型カテーテルによるIVH ⑤ ポートフラッシュ用 処置)生食注シリンジ「NP」10mL | 2筒 | | 時間未定 | |
| | 処方 コメント | | | | | |