

採用薬品一覧（２０２２年１２月更新）

採用区分	製品名	規格
院外専用	アーチスト錠10mg	10mg/錠
院外専用	アーチスト錠2.5mg	2.5mg/錠
院外専用	アーリーダ錠60mg	60mg/錠
院外専用	アイベータ配合点眼液	5mL/本
院外専用	アイミクス配合錠HD	1錠
院外専用	アイラミド配合懸濁性点眼液	5mL/本
院外専用	アクトス錠15	15mg/錠
院外専用	アサコール錠400mg	400mg/錠
院外専用	アシテアダニ舌下錠100単位(IR)	100単位(IR)/錠
院外専用	アシテアダニ舌下錠300単位(IR)	300単位(IR)/錠
院外専用	アシノン錠150mg	150mg/錠
院外専用	アズノールST錠口腔用5mg	5mg/錠
院外専用	アスパラカリウム錠300mg	1.8mEq/錠
院外専用	アスパラカリウム散50%	2.9mEq/g
院外専用	アズマネックスツイストヘラー100 μ g60吸入	100 μ g/吸入, 60吸入/本
院外専用	アズマネックスツイストヘラー200 μ g60吸入	200 μ g/吸入, 60吸入/本
院外専用	アゼプチン錠1mg	1mg/錠
院外専用	アゾルガ配合懸濁性点眼液	5mL/本
院外専用	アダラートCR錠20mg	20mg/錠
院外専用	アテキュラ吸入用カプセル中用量	1Cap
院外専用	アテキュラ吸入用カプセル高用量	1Cap
院外専用	アテディオ配合錠	1錠
院外専用	アドエア125エアゾール120吸入用	120回噴霧/缶
院外専用	アドエア250エアゾール120吸入用	120回噴霧/缶
院外専用	アドエア250ディスカス60吸入用	60プリスター/キット
院外専用	アドエア50エアゾール120吸入用	120回噴霧/缶
院外専用	アトーゼット配合錠HD	1錠
院外専用	アトーゼット配合錠LD	1錠
院外専用	アドナ錠30mg	30mg/錠
院外専用	アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用	100 μ g/吸入, 30吸入/本
院外専用	アノーロエリプタ30吸入用	30吸入/キット
院外専用	アマリール0.5mg錠	0.5mg/錠
院外専用	アマリール1mg錠	1mg/錠
院外専用	アミティーザカプセル24 μ g	24 μ g/Cap
院外専用	アムロジンOD錠5mg	5mg/錠
院外専用	アモバン錠10	10mg/錠
院外専用	アラミスト点鼻液27.5 μ g120噴霧用	27.5 μ g120噴霧用10g/本
院外専用	アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用	27.5 μ g56噴霧用6g/本
院外専用	アリミデックス錠1mg	1mg/錠
院外専用	アルサルミン内用液10%	10mL/包
院外専用	アルサルミン細粒90% 1g/包	1g/包
院外専用	アルダクトンA錠25mg	25mg/錠
院外専用	アルファロールカプセル0.25 μ g	0.25 μ g/Cap
院外専用	アルファロールカプセル1 μ g	1 μ g/Cap
院外専用	アレグラドライシロップ5%	15mg/包
院外専用	アレグラ錠60mg	60mg/錠
院外専用	アレジオンLX点眼液0.1%	0.1%5mL/本
院外専用	アレロックOD錠5mg	5mg/錠
院外専用	アロマシン錠25mg	25mg/錠
院外専用	アンテベートクリーム0.05%	0.05%5g/本
院外専用	アンテベートローション0.05%	0.05%5g/本
院外専用	アンテベート軟膏0.05%	0.05%5g/本
院外専用	アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg/個
院外専用	イクスタンジ錠80mg	80mg/錠
院外専用	イソジンガーグル液	7%30mL/本

院外専用	イソバイドシロップ70%	350g500mL/瓶
院外専用	イソバイドシロップ70%分包20mL	14.0g20mL/包
院外専用	イソバイドシロップ70%分包30mL	21.0g30mL/包
院外専用	イソメニールカプセル7.5mg	7.5mg/Cap
院外専用	イニシンク配合錠	1錠
院外専用	イノラス配合経腸用液(りんご)	187.5mL/パウチ
院外専用	イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.5mg/Cap
院外専用	イフェクサーSRカプセル75mg	75mg/Cap
院外専用	イブランス錠125mg	125mg/錠
院外専用	イブランス錠25mg	25mg/錠
院外専用	イリボーOD錠5 μ g	5 μ g/錠
院外専用	イルベタン錠100mg	100mg/錠
院外専用	インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」	300単位3mL/キット
院外専用	インフリーカプセル100mg	100mg/Cap
院外専用	ウェールナラ配合錠	1錠
院外専用	ウルソ錠100mg	100mg/錠
院外専用	エースコール錠2mg	2mg/錠
院外専用	エカード配合錠HD	1錠
院外専用	エクア錠50mg	50mg/錠
院外専用	エクメット配合錠HD	1錠
院外専用	エクメット配合錠LD	1錠
院外専用	エクラープラスター20 μ g/cm ²	7.5cm×10cm/枚
院外専用	エクリラ400 μ gジェヌエア30吸入用	30吸入/キット
院外専用	エストラーナテープ0.36mg	0.36mg/枚, 70枚
院外専用	エックスフォージ配合錠	1錠
院外専用	エディロールカプセル0.75 μ g	0.75 μ g/Cap
院外専用	エナジア吸入用カプセル中用量(7Cap/枚)	1Cap
院外専用	エビスタ錠60mg	60mg/錠
院外専用	エビデュオゲル15g	15g/本
院外専用	エピペン注射液0.15mg	1mg2mL/本 (1回注射量0.3mL)
院外専用	エビリファイ錠12mg	12mg/錠
院外専用	エビリファイ内用液0.1%	1mg/mL/包
院外専用	エベレンゾ錠100mg	100mg/錠
院外専用	エベレンゾ錠20mg	20mg/錠
院外専用	エベレンゾ錠50mg	50mg/錠
院外専用	エレルサ錠50mg	50mg/錠
院外専用	エンシュア・H(ストロベリー味)	250mL/缶
院外専用	エンシュア・H(バナナ味)	250mL/缶
院外専用	エンシュア・H(メロン味)	250mL/缶
院外専用	エンシュア・H(黒糖味)	250mL/缶
院外専用	エンシュア・H(抹茶味)	250mL/缶
院外専用	オーキシス9 μ gタービュヘイラー28吸入	252 μ g/本 (1回吸入量: 9 μ g)
院外専用	オクソラレンローション1%	(10mg/g) 30mL/本
院外専用	オクソラレン錠10mg	10mg/錠
院外専用	オテズラ錠10mg	10mg/錠
院外専用	オテズラ錠20mg	20mg/錠
院外専用	オテズラ錠30mg	30mg/錠
院外専用	オルベスコ100 μ gインヘラー56吸入用	5.6mg3.3g/缶
院外専用	オルミエント錠2mg	2mg/錠
院外専用	オルミエント錠4mg	4mg/錠
院外専用	オルメテックOD錠20mg	20mg/錠
院外専用	オングリザ錠2.5mg	2.5mg/錠
院外専用	オングリザ錠5mg	5mg/錠
院外専用	オンプレス吸入用カプセル150 μ g	150 μ g/Cap
院外専用	ガスターD錠20mg	20mg/錠
院外専用	ガスモチン錠5mg	5mg/錠
院外専用	カソデックスOD錠80mg	80mg/錠
院外専用	ガチフロ点眼液0.3%	(3mg/mL) 5mL/本

院外専用	カデュエット配合錠4番	1錠
院外専用	カナグル錠100mg	100mg/錠
院外専用	カバサル錠0.25mg	0.25mg/錠
院外専用	カボメティクス錠20mg	20mg/錠
院外専用	カボメティクス錠60mg	60mg/錠
院外専用	ガランターゼ散50%	50% 500mg/g
院外専用	カリメート経口液20% アップルフレーバー	5.0g25g/包
院外専用	カリメート経口液20% オレンジフレーバー	5.0g25g/包
院外専用	カルタン錠500mg	500mg/錠
院外専用	カルデナリン錠1mg	1mg/錠
院外専用	キックリンカプセル250mg	250mg/Cap
院外専用	キャブピリン配合錠	1錠
院外専用	グーフィス錠5mg	5mg/錠
院外専用	グラクティブ錠100mg	100mg/錠
院外専用	グラクティブ錠25mg	25mg/錠
院外専用	グラクティブ錠50mg	50mg/錠
院外専用	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠〔EKT-25〕	1錠
院外専用	クラシエ五苓散料エキス錠〔EKT-17〕	0.127g/錠
院外専用	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒〔EK-12〕	2.0g/包
院外専用	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒〔KB-6〕	3.0g/包
院外専用	クラシエ小青竜湯エキス錠〔EKT-19〕	252錠（3錠×6連包×14シート）
院外専用	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠〔EKT-16〕	1錠
院外専用	クラシエ半夏瀉心湯エキス錠〔EKT-14〕	1錠
院外専用	グラジナ錠50mg	50mg/錠
院外専用	クラビット錠500mg	500mg/錠
院外専用	クラリチン錠10mg	10mg/錠
院外専用	クリノリル錠100	100mg/錠
院外専用	グリミクロンHA錠20mg	20mg/錠
院外専用	グルベス配合OD錠	1錠
院外専用	クレストールOD錠2.5mg	2.5mg/錠
院外専用	クレストール錠5mg	5mg/錠
院外専用	クレナフィン爪外用液10%	10%3.56g（4mL）1本
院外専用	クロミッド錠50mg	50mg/錠
院外専用	ケイキサレートドライシロップ76%	76%3.27g/包
院外専用	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	250mg/錠
院外専用	ケラチナミンコーワクリーム20%	20%25g/本
院外専用	コンプトミニ配合点眼液	0.4mL/個
院外専用	コムクロシャンプー0.05%	0.05%125mL/本
院外専用	コレクチム軟膏0.25%	0.25%5g/本
院外専用	コレクチム軟膏0.5%	0.5%5g/本
院外専用	コンプラビン配合錠	1錠
院外専用	ザイロリック錠100mg	100mg/錠
院外専用	ザクラス配合錠HD	1錠
院外専用	サノレックス錠0.5mg	0.5mg/錠
院外専用	ザファテック錠100mg	100mg/錠
院外専用	サムスカOD錠30mg	30mg/錠
院外専用	ザルティア錠5mg	5mg/錠
院外専用	サワシリンカプセル250mg	250mg/Cap
院外専用	シーブリ吸入用カプセル50μg	50μg/Cap
院外専用	ジェイゾロフトOD錠100mg	100mg/錠
院外専用	ジェイゾロフトOD錠25mg	25mg/錠
院外専用	ジェミーナ配合錠(21錠/枚)	21錠/枚
院外専用	ジェミーナ配合錠(28錠/枚)	28錠/枚
院外専用	ジクアス点眼液3%	3%5mL/本
院外専用	シグマート錠5mg	5mg/錠
院外専用	ジセレカ錠100mg	100mg/錠
院外専用	ジセレカ錠200mg	200mg/錠
院外専用	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	1錠

院外専用	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	1錠
院外専用	ジピリダモール散12.5%「JG」	12.5%125mg/g
院外専用	シムピコートタービュヘイラー30吸入	30吸入/本
院外専用	ジャディアンス錠25mg	25mg/錠
院外専用	シュアポスト錠0.5mg	0.5mg/錠
院外専用	ジュリナ錠0.5mg	0.5mg/錠
院外専用	ジルテック錠10	10mg/錠
院外専用	スイニー錠100mg	100mg/錠
院外専用	スージャヌ配合錠	1錠
院外専用	スクラルファート内用液10%「タイヨー」	1g10mL/包
院外専用	スタレボ配合錠L100	1錠
院外専用	スタレボ配合錠L50	1錠
院外専用	ストラテラカプセル10mg	10mg/Cap
院外専用	ストラテラカプセル25mg	25mg/Cap
院外専用	ストラテラカプセル40mg	40mg/Cap
院外専用	ストラテラ内用液0.4%	0.4%100mL/V
院外専用	スピオルトレスピマツト60吸入	60吸入/キット
院外専用	スピリーバ吸入用カプセル18 μ g	18 μ g/Cap
院外専用	スミスリンローション5%	50mg/g
院外専用	ゼジューラ錠100mg	100mg/錠
院外専用	セディール錠5mg	5mg/錠
院外専用	セパゾン散1%	10mg/g
院外専用	ゼビアックス油性クリーム2%	2%10g/本
院外専用	ゼビアックスローション2%	2%10g/本
院外専用	ゼフィックス錠100	100mg/錠
院外専用	セルベックスカプセル50mg	50mg/Cap
院外専用	セレキノン錠100mg	100mg/錠
院外専用	セレクトール錠200mg	200mg/錠
院外専用	セレニカR錠400mg	400mg/錠
院外専用	セレネース錠3mg	3mg/錠
院外専用	セロクエル100mg錠	100mg/錠
院外専用	ゼンタコートカプセル3mg	3mg/Cap
院外専用	ゾーミッグRM錠2.5mg	2.5mg/錠
院外専用	ダーブロック錠1mg	1mg/錠
院外専用	ダイアコートクリーム0.05%	0.05%5g/本
院外専用	ダイアモックス末	末
院外専用	タグリッソ錠40mg	40mg/錠
院外専用	タケプロンOD錠15	15mg/錠
院外専用	タケルダ配合錠	1錠
院外専用	タプロコム配合点眼液	2.5mL/本
院外専用	タプロスミニ点眼液0.0015%	0.0015%0.3mL/本
院外専用	タプロス点眼液0.0015%	0.0015%2.5mL/本
院外専用	タモキシフェン錠20mg「DSEP」	20mg/錠
院外専用	タリオン錠10mg	10mg/錠
院外専用	タリムス点眼液0.1%	0.1%5mL/本
院外専用	チャンピックス錠1mg	1mg/錠
院外専用	チラーヂンS錠25 μ g	25 μ g/錠
院外専用	ツベルミン錠100mg	100mg/錠
院外専用	ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-3〕	2.5g/包
院外専用	ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-106〕	2.5g/包
院外専用	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-18〕	2.5g/包
院外専用	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-50〕	2.5g/包
院外専用	ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）〔TJ-70〕	2.5g/包
院外専用	ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-96〕	2.5g/包
院外専用	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-9〕	2.5g/包
院外専用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-19〕	3g/包
院外専用	ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-40〕	2.5g/包
院外専用	ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）〔TJ-47〕	2.5g/包

院外専用	ソムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-38〕	2.5g/包
院外専用	ソムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）〔TJ-7〕	2.5g/包
院外専用	ソムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-37〕	2.5g/包
院外専用	ソムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-39〕	2.5g/包
院外専用	ディオバン錠80mg	80mg/錠
院外専用	ディナゲスト錠0.5mg	0.5mg/錠
院外専用	ディピゲル1mg	1mg1g/包
院外専用	ディレグラ配合錠	1錠
院外専用	デトルシールカプセル4mg	4mg/Cap
院外専用	テネリア錠20mg	20mg/錠
院外専用	デパス錠0.5mg	0.5mg/錠
院外専用	デベルザ錠20mg	20mg/錠
院外専用	デュアック配合ゲル	10g1本
院外専用	デュオトラバ配合点眼液	2.5mL/本
院外専用	テリルジー100エリプタ30吸入用	30吸入/キット
院外専用	テリルジー200エリプタ30吸入用	30吸入/キット
院外専用	トピロリック錠40mg	40mg/錠
院外専用	ドプスOD錠100mg	100mg/錠
院外専用	ドボベットゲル	15g/本
院外専用	ドボベットフォーム	60g/本
院外専用	ドボベット軟膏	15g/本
院外専用	ドラール錠15	15mg/錠
院外専用	トラディアンス配合錠A P	1錠
院外専用	トラディアンス配合錠B P	1錠
院外専用	トラバタンズ点眼液0.004%	0.004%2.5mL/本
院外専用	トランサミンシロップ5%	5%50mg/mL
院外専用	トランサミン錠250mg	250mg/錠
院外専用	トリキュラー錠21	(21日分)1組(赤褐色錠6錠，白色錠5錠，淡黄褐色錠10錠)
院外専用	トリンテリックス錠10mg	10mg/錠
院外専用	トリンテリックス錠20mg	20mg/錠
院外専用	ニバジール錠4mg	4mg/錠
院外専用	ニューベクオ錠300mg	300mg/錠
院外専用	ネイリンカプセル100mg	100mg/Cap
院外専用	ネオキシテープ73.5mg	73.5mg/枚
院外専用	ネオドバストン配合錠L100	1錠
院外専用	ネシーナ錠25mg	25mg/錠
院外専用	ノルスバンテープ10mg	10mg/枚
院外専用	ノルスバンテープ20mg	20mg/枚
院外専用	ノルバデックス錠10mg	10mg/錠
院外専用	ノルバデックス錠20mg	20mg/錠
院外専用	ハーボニー配合錠	1錠
院外専用	ハイペン錠200mg	200mg/錠
院外専用	バキシルCR錠12.5mg	12.5mg/錠
院外専用	バクスミー点鼻粉末剤3mg	3mg/瓶
院外専用	バクタ配合顆粒	1g/包
院外専用	パナルジン錠100mg	100mg/錠
院外専用	バナンドライシロップ5%	50mg/g
院外専用	パピロックミニ点眼液0.1%	0.1%0.4mL/本
院外専用	バフセオ錠150mg	150mg/錠
院外専用	バフセオ錠300mg	300mg/錠
院外専用	バリエット錠10mg	10mg/錠
院外専用	バルトレックス錠500	500mg/錠
院外専用	ハルナールD錠0.2mg	0.2mg/錠
院外専用	ビ・シフロール錠0.5mg	0.5mg/錠
院外専用	ピートル顆粒分包250mg	250mg/包
院外専用	ビオスミン配合散	500g/本
院外専用	ビオフェルミン錠剤	12mg/錠
院外専用	ピソルボン吸入液0.2%	0.2%45mL/本

院外専用	ビムパットドライシロップ10%	100mg/g
院外専用	ピメノールカプセル50mg	50mg/Cap
院外専用	ヒューマリンN注ミリオペン	300単位3mL/キット
院外専用	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位/キット
院外専用	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位/キット
院外専用	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	40mg0.4mL/筒
院外専用	ピラノアOD錠20mg	20mg/錠
院外専用	ヒルドイドクリーム0.3%	0.3%20g/本
院外専用	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	0.3%25g/本
院外専用	ヒルドイドフォーム0.3%	原液92g/缶
院外専用	ヒルドイドローション0.3%	0.3%50g/本
院外専用	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	120吸入/キット
院外専用	ファムビル錠250mg	250mg/錠
院外専用	フィコンパ細粒1%	10mg/g
院外専用	ブイフェンド錠200mg	200mg/錠
院外専用	ブイフェンド錠50mg	50mg/錠
院外専用	フェアストン錠40	40mg/錠
院外専用	フェロミア錠50mg	470.9mg(鉄として50mg)/錠
院外専用	フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ8mg「テイコク」	8mg/枚
院外専用	フェントステープ0.5mg	0.5mg/枚
院外専用	フェントステープ8mg	8mg/枚
院外専用	フオイパン錠100mg	100mg/錠
院外専用	ブラダロン錠200mg	200mg/錠
院外専用	プラビックス錠75mg	75mg/錠
院外専用	フランドルテープ40mg	40mg/枚
院外専用	フリバスOD錠75mg	75mg/錠
院外専用	プルゼニド錠12mg	12mg/錠
院外専用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	120吸入/瓶
院外専用	プレタールOD錠50mg	50mg/錠
院外専用	プレミネント配合錠LD	1錠
院外専用	プロマックD錠75	75mg/錠
院外専用	プロメライン軟膏5万単位/g	(50,000単位/g) 20g/本
院外専用	ベイスン錠0.3mg	0.3mg/錠
院外専用	ページニオ錠100mg	100mg/錠
院外専用	ページニオ錠150mg	150mg/錠
院外専用	ページニオ錠50mg	50mg/錠
院外専用	ベオーバ錠50mg	50mg/錠
院外専用	ペガモックス点眼液0.5%	(5mg/mL) 5mL/本
院外専用	ベザトールSR錠200mg	200mg/錠
院外専用	ベシケアOD錠2.5mg	2.5mg/錠
院外専用	ベシケアOD錠5mg	5mg/錠
院外専用	ベセルナクリーム5%	12.5mg/包(250mg)
院外専用	ベタキシロール点眼液0.5%「SW」	(5mg/mL) 5mL/本
院外専用	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	0.3%200g/本
院外専用	ベピオゲル2.5%	2.5%15g/本
院外専用	ベルソムラ錠10mg	10mg/錠
院外専用	ベロテックエロゾル100	20mg10mL/ボンベ(1回噴霧中0.1mg)
院外専用	ペンタサ顆粒94%	(250,500,1000,2000mg) /包
院外専用	ホクナリンテープ1mg	1mg/枚
院外専用	ホスレノールOD錠500mg	500mg/錠
院外専用	ボナロン経口ゼリー35mg	35mg/包 (2g)
院外専用	ボナロン錠35mg	35mg/錠
院外専用	ボノサップパック400	1シート
院外専用	ボノピオンパック	1シート
院外専用	ボルタレンサポ25mg	25mg/個
院外専用	ボルタレンサポ50mg	50mg/個
院外専用	ボルタレン錠25mg	25mg/錠
院外専用	ボンピバ錠100mg	100mg/錠

院外専用	マーデュオックス軟膏	10g/本
院外専用	マイザー軟膏0.05%☒	(0.5mg/g) 5g/本
院外専用	マيسリー錠10mg	10mg/錠
院外専用	マヴィレット配合錠	1錠
院外専用	マリゼブ錠12.5mg	12.5mg/錠
院外専用	マリゼブ錠25mg	25mg/錠
院外専用	ミカムロ配合錠AP	1錠
院外専用	ミカルデイス錠40mg	40mg/錠
院外専用	ミケランLAカプセル15mg	15mg/Cap
院外専用	ミケラン細粒1%	10mg/g
院外専用	ミケルナ配合点眼液	2.5mL/本
院外専用	ミティキュア ダニ舌下錠10,000JAU☒	1錠
院外専用	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	1錠
院外専用	ミニリンメルトOD錠25 μ g	25 μ g/錠
院外専用	ミネプロ錠2.5mg	2.5mg/錠
院外専用	ミノマイシン錠50mg	50mg/錠
院外専用	ムコスタ錠100mg	100mg/錠
院外専用	ムコスタ点眼液UD2%	2%0.35mL/本
院外専用	ムコソルバンL錠45mg	45mg/錠
院外専用	ムコソルバン錠15mg	15mg/錠
院外専用	ムコダインDS50%	50% 500mg/g
院外専用	ムコダインシロップ5%	50mg/mL
院外専用	ムコダイン錠500mg	500mg/錠
院外専用	メタルカプターゼカプセル100mg	100mg/Cap
院外専用	メトアナ配合錠HD	1錠
院外専用	メトアナ配合錠LD	1錠
院外専用	メプチンシロップ5 μ g/mL	5 μ g/mL
院外専用	メプチンスイングヘラー10 μ g吸入100回	1mg/キット (1吸入中10 μ g)
院外専用	メプチンミニ錠25 μ g	25 μ g/錠
院外専用	メプチン吸入液ユニット0.3mL	100 μ g/mL (0.3mL/個)
院外専用	メマリーOD錠10mg	10mg/錠
院外専用	メマリーOD錠20mg	20mg/錠
院外専用	メラトベル顆粒小児用0.2%	2mg/g
院外専用	メルカゾール錠2.5mg	2.5mg/錠
院外専用	モイゼルト軟膏0.3%	(3mg/g) 10g/本
院外専用	モイゼルト軟膏1%	(10mg/g) 10g/本
院外専用	モーバー錠100mg	100mg/錠
院外専用	モーステープL40mg	10cm×14cm/枚
院外専用	モースパップXR120mg	10cm×14cm/枚
院外専用	モースパップXR240mg	20cm×14cm/枚
院外専用	ヤーズフレックス配合錠	1錠
院外専用	ユーバスタコーワ軟膏	100g/本
院外専用	ユーロジン2mg錠	2mg/錠
院外専用	ユニシア配合錠HD	1錠
院外専用	ユリーフOD錠4mg	4mg/錠
院外専用	ユリス錠0.5mg	0.5mg/錠
院外専用	ユリス錠1mg	1mg/錠
院外専用	ユリス錠2mg	2mg/錠
院外専用	ヨーデルS糖衣錠－80	80mg/錠
院外専用	ヨクイニンエキス散「コタロー」	2.0g/包
院外専用	ラキシベロン内用液0.75%	0.75%10mL/本
院外専用	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	60%500mL/瓶
院外専用	ラコールNF配合経腸用液	200mL/パウチ
院外専用	ラシックス錠40mg	40mg/錠
院外専用	ラジレス錠150mg	150mg/錠
院外専用	ラスビック錠75mg	75mg/錠
院外専用	ラベキュアパック400	1シート
院外専用	ラベファインパック	1シート

院外専用	ランタスXR注ソロスター	450単位1.5mL/キット
院外専用	ランタス注ソロスター	300単位/キット
院外専用	ランデル錠40	40mg/錠
院外専用	リーバクト配合顆粒	4.15g/包
院外専用	リオナ錠250mg	250mg/錠
院外専用	リオベル配合錠LD	1錠
院外専用	リカルボン錠50mg	50mg/錠
院外専用	リクシアナOD錠60mg	60mg/錠
院外専用	リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg/枚
院外専用	リバスタッチパッチ18mg	18mg/枚
院外専用	リバスタッチパッチ4.5mg	4.5mg/枚
院外専用	リバスタッチパッチ9mg	9mg/枚
院外専用	リバロOD錠2mg	2mg/錠
院外専用	リピトール錠10mg	10mg/錠
院外専用	リファジンカプセル150mg	150mg/Cap
院外専用	リフヌア錠45mg	45mg/錠
院外専用	リベルサス錠14mg	14mg/錠
院外専用	リベルサス錠7mg	7mg/錠
院外専用	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	0.025%15mL/瓶（レボカバスチンとして）
院外専用	リムパーザ錠100mg	100mg/錠
院外専用	リムパーザ錠150mg	150mg/錠
院外専用	リリカOD錠75mg	75mg/錠
院外専用	リリカカプセル25mg	25mg/Cap
院外専用	リンヴォック錠15mg	15mg/錠
院外専用	リンヴォック錠7.5mg	7.5mg/錠
院外専用	リンデロン錠0.5mg	0.5mg/錠
院外専用	ルーラン錠8mg	8mg/錠
院外専用	ルコナック爪外用液5%	3.5g/4mL
院外専用	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg/錠
院外専用	ルナベル配合錠ULD	1錠
院外専用	ルネスタ錠1mg	1mg/錠
院外専用	レキサルティ錠1mg	1mg/錠
院外専用	レキサルティ錠2mg	2mg/錠
院外専用	レキップCR錠8mg	8mg/錠
院外専用	レキップ錠0.25mg	0.25mg/錠
院外専用	レキップ錠1mg	1mg/錠
院外専用	レキップ錠2mg	2mg/錠
院外専用	レクタブル2mg注腸フォーム14回	30.8g/缶
院外専用	レザルタス配合錠HD	1錠
院外専用	レナジェル錠250mg	250mg/錠
院外専用	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%（般）	5mg/g
院外専用	レミニールOD錠12mg	12mg/錠
院外専用	レミニールOD錠4mg	4mg/錠
院外専用	レミニールOD錠8mg	8mg/錠
院外専用	レルパックス錠20mg	20mg/錠
院外専用	レルベア100エリプタ30吸入用	30吸入/キット
院外専用	レルベア200エリプタ30吸入用	30吸入/キット
院外専用	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg/錠
院外専用	ロキソニンテープ100mg	100mg2g/枚(10cm×14cm/枚)(1袋：7枚)
院外専用	ロキソニン錠60mg	60mg/錠
院外専用	ロコアテープ	10cm×14cm1枚
院外専用	ロゼックスゲル0.75%	15g/本
院外専用	ワントラム錠100mg	100mg/錠
院外専用	小児用バクシダール錠50mg	50mg/錠
採用	10%アブプレゾリン散「SUN」	100mg/g
採用	25mgアリナミンF糖衣錠	25mg/錠
採用	2mgセルシン錠	2mg/錠
採用	5mgセルシン錠	5mg/錠

採用	L- ケフレックス小児用顆粒	1g/包
採用	MSコンチン錠10mg	10mg/錠
採用	MSコンチン錠30mg	30mg/錠
採用	PL配合顆粒	1g/包
採用	S・M配合散	1.3g/包
採用	アーテン錠（2mg）	2mg/錠
採用	アイセントレス錠400mg	400mg/錠
採用	アイトロール錠20mg	20mg/錠
採用	アイピーディカプセル100	100mg/Cap
採用	アキネトン細粒1%	10mg/g
採用	アキネトン錠1mg	1mg/錠
採用	アクトネル錠75mg	75mg/錠
採用	アコファイド錠100mg	100mg/錠
採用	アザルフィジンEN錠250mg	250mg/錠
採用	アジルバ錠20mg	20mg/錠
採用	アジレクト錠1mg	1mg/錠
採用	アストミン錠10mg	10mg/錠
採用	アスペノンカプセル20	20mg/Cap
採用	アスベリンシロップ0.5%	5mg/mL
採用	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	17.6%/mL
採用	アゾセミド錠60mg「JG」	60mg/錠
採用	アダプチノール錠5mg	5mg/錠
採用	アタラックス-Pカプセル25mg	25mg/Cap（ヒドロキシジン塩酸塩として）
採用	アタラックス-Pシロップ0.5%	5mg/mL（ヒドロキシジン塩酸塩として）
採用	アデホスコーフ顆粒10%	100mg1g/包
採用	アテレック錠10	10mg/錠
採用	アドソルビン原末	末
採用	アトルバスタチン錠10mg「トーワ」	10mg/錠
採用	アナストロゾール錠1mg「DSEP」	1mg/錠
採用	アナフラニール錠10mg	10mg/錠
採用	アブストラル舌下錠100 μ g	100 μ g/錠
採用	アブストラル舌下錠200 μ g	200 μ g/錠
採用	アプレピタントカプセル125mg「NK」	125mg/Cap
採用	アプレピタントカプセル80mg「NK」	80mg/Cap
採用	アベロックス錠400mg	400mg/錠
採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	100mg/錠
採用	アミティーザカプセル12 μ g	12 μ g/Cap
採用	アミノレバンEN配合散(コーヒー味)	50g/包
採用	アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	50g/包
採用	アムロジピンOD錠5mg「杏林」	5mg/錠
採用	アメナリーフ錠200mg	200mg/錠
採用	アモキサシカプセル25mg	25mg/Cap
採用	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	250mg/Cap
採用	アラグリオ顆粒剤分包1.5g	1.5g/包
採用	アルケラン錠2mg	2mg/錠
採用	アルジオキサ錠100mg「あすか」	100mg/錠
採用	アルダクトンA細粒10%	100mg/g
採用	アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「フソー」	0.25 μ g/Cap
採用	アルファカルシドールカプセル1.0 μ g「フソー」	1 μ g/Cap
採用	アルファロール内用液0.5 μ g/mL	0.5 μ g/mL, 10mL/瓶
採用	アルロイドG内用液5%	5g/100mL
採用	アレジオンドライシロップ1%	10mg/g
採用	アレジオン錠20	20mg/錠
採用	アレピアチン散10%	100mg/g
採用	アレピアチン錠25mg	25mg/錠
採用	アレロック顆粒0.5%	2.5mg/包（0.5g）
採用	アレンドロン酸錠 35mg「NIG」	35mg/錠
採用	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg/錠

採用	アロプリノール錠100mg「杏林」	100mg/錠
採用	アンプラーグ錠100mg	100mg/錠
採用	イーケブラドライシロップ50%	50% 500mg/g
採用	イーケブラ錠500mg	500mg/錠
採用	イグザレルトOD錠10mg	10mg/錠
採用	イグザレルトOD錠15mg	15mg/錠
採用	イクスタンジ錠40mg	40mg/錠
採用	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」	900mg/包
採用	イスコチン錠100mg	100mg/錠
採用	イソソルビド内用液70%「CEO」	350g500mL/瓶
採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	10mg/mL
採用	イトリゾールカプセル50	50mg/Cap
採用	イノラス配合経腸用液(いちご)	187.5mL/パウチ
採用	イノラス配合経腸用液(ヨーグルト)	187.5mL/パウチ
採用	イミダフェナシンOD錠 0.1mg「杏林」	0.1mg/錠
採用	イムラン錠50mg	50mg/錠
採用	インクレミンシロップ5%	50mg/mL(Fe : 6mg/mL)
採用	インデラル錠10mg	10mg/錠
採用	ウテメリン錠5mg	5mg/錠
採用	ウブレチド錠5mg	5mg/錠
採用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」	100mg/錠
採用	ウロカルン錠225mg	225mg/錠
採用	エクセグラン散20%	200mg/g
採用	エクセグラン錠100mg	100mg/錠
採用	エクセラゼ配合錠	1錠
採用	エクフィナ錠50mg	50mg/錠
採用	エサンブトール錠250mg	250mg/錠
採用	エスゾピクロン錠1mg「サワイ」	1mg/錠
採用	エスタゾラム錠2mg「アメル」	2mg/錠
採用	エストラサイトカプセル156.7mg	140mg/Cap(エストラムスチンリン酸エステルとして)
採用	エストリール錠1mg	1mg/錠
採用	エスワнтаイホウ配合OD錠T20	20mg/錠 (テガフル相当量)
採用	エスワнтаイホウ配合OD錠T25	25mg/錠 (テガフル相当量)
採用	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	10mg/錠
採用	エチゾラム錠0.5mg「SW」	0.5mg/錠
採用	エトドラク錠200mg「SW」	200mg/錠
採用	エドルミズ錠50mg	50mg/錠
採用	エネーゴ配合経腸用液	250mL/缶
採用	エバステルOD錠10mg	10mg/錠
採用	エバミール錠1.0	1mg/錠
採用	エビプロスタット配合錠DB	錠
採用	エビリファイOD錠12mg	12mg/錠
採用	エビリファイ錠3mg	3mg/錠
採用	エビリファイ内用液0.1%	3mg3mL/包
採用	エピレオプチマル散50%	500mg/g
採用	エフィエントOD錠20mg	20mg/錠
採用	エフィエント錠3.75mg	3.75mg/錠
採用	エフビーOD錠2.5	2.5mg/錠
採用	エフメノカプセル100mg	100mg/Cap
採用	エブランチルカプセル15mg	15mg/Cap
採用	エリキュース錠2.5mg	2.5mg/錠
採用	エリキュース錠5mg	5mg/錠
採用	エリスロマイシン錠200mg「サワイ」	200mg/錠
採用	エルカルチンFF内用液10%	1g10mL/瓶
採用	エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーフ」	0.75 μ g/錠
採用	エレンタール配合内用剤	80g/袋
採用	エンシュア・H(コーヒー味)	250mL/缶
採用	エンシュア・H(バニラ味)	250mL/缶

採用	エンタカポン錠100mg「サンド」	100mg/錠
採用	エンドキサン錠50mg	50mg/錠
採用	エンレスト錠100mg	100mg/錠
採用	エンレスト錠200mg	200mg/錠
採用	オイグルコン錠2.5mg	2.5mg/錠
採用	オーグメンチン配合錠250RS	(125mg + 250mg)/錠
採用	オキシコンチンTR錠5mg	5mg/錠
採用	オキシコンチン徐放錠 10mgNX「第一三共」	10mg/錠
採用	オキシコンチン徐放錠 20mgNX「第一三共」	20mg/錠
採用	オキシコンチン徐放錠 40mgNX「第一三共」	40mg/錠
採用	オキシコンチン徐放錠 5mgNX「第一三共」	5mg/錠
採用	オキノーム散2.5mg	2.5mg0.5g/包
採用	オキノーム散20mg	20mg/包 (1g)
採用	オキノーム散5mg	5mg/包 (1g)
採用	オゼックス錠150	150mg/錠
採用	オダイン錠125mg	125mg/錠
採用	オノンカプセル112.5mg	112.5mg/Cap
採用	オノンドライシロップ10%	100mg/g
採用	オプソ内服液10mg	10mg5mL/包
採用	オプソ内服液5mg	5mg2.5mL/包
採用	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	2g/包
採用	オルミエント錠2mg	2mg/錠
採用	オルミエント錠4mg	4mg/錠
採用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg/錠
採用	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	5mg/錠
採用	オンジェンティス錠25mg	25mg/錠
採用	ガスコン錠40mg	40mg/錠
採用	ガスター散10%	100mg/g
採用	ガストローム顆粒66.7%	1g1.5g/包
採用	ガスモチン散1%	10mg/g
採用	カナリア配合錠	1錠
採用	カバサル錠1.0mg	1mg/錠
採用	カプトリル細粒5%	50mg/g
採用	カベシタピン錠300mg「ヤクルト」	300mg/錠
採用	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	100mg/錠
採用	カリメート散	5g/包
採用	カルスロット錠20	20mg/錠
採用	カルナクリン錠50	50単位/錠
採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	30mg/錠
採用	カルブロック錠16mg	16mg/錠
採用	カルベジロール錠10mg「サワイ」	10mg/錠
採用	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	2.5mg/錠
採用	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	50mg/mL
採用	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	50% 500mg/g
採用	カルボシステイン錠500mg「サワイ」	500mg/錠
採用	カロナール細粒20%	0.5g(100mg)/包
採用	カロナール細粒20%	1g(200mg)/包
採用	カロナール細粒50%	500mg/g
採用	カロナール細粒50%	0.6g(300mg)/包
採用	カロナール細粒50%	1g(500mg)/包
採用	カロナール錠200	200mg/錠
採用	カロナール錠300	300mg/錠
採用	カンデサルタン錠8mg「あすか」	8mg/錠
採用	キネダック錠50mg	50mg/錠
採用	キプレス細粒4mg	4mg/包 (0.5g)
採用	キョウニン水シオエ	500mL/瓶
採用	クエンメット配合散	1g/包
採用	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	470.9mg(鉄として50mg)/錠

採用	グラケーカプセル15mg	15mg/Cap
採用	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒〔EK-49〕	2.5g/包
採用	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒〔EK-25〕	2.0g/包
採用	クラシエ柴苓湯エキス細粒〔EK-114〕	2.7g/包
採用	クラシエ十全大補湯エキス細粒〔EK-48〕	2.5g/包
採用	クラシエ人参養栄湯エキス細粒〔EK-108〕	2.5g/包
採用	クラシエ桃核承気湯エキス錠〔EKT-61〕	3錠/包
採用	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒〔EK-23〕	2.0g/包
採用	クラシエ補中益気湯エキス細粒〔EK-41〕	2.5g/包
採用	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒〔EK-68〕	2g/包
採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	0.505g/包
採用	グラマリール細粒10%	100mg/g
採用	クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」	100mg/g
採用	クラリスロマイシン錠200mg「大正」	200mg/錠
採用	グランダキシン錠50	50mg/錠
採用	クリアナール錠200mg	200mg/錠
採用	グリチロン配合錠	錠
採用	グリベック錠100mg	100mg/錠
採用	グリミクロン錠40mg	40mg/錠
採用	グリメビリド錠1mg「VTRS」	1mg/錠
採用	グルコンサンK細粒4mEq/g	937mg/g (K : 4mEq/g)
採用	グルコンサンK錠5mEq	1170mg/錠(K : 5mEq/錠)
採用	グレースビット錠50mg	50mg/錠
採用	クレメジン速崩錠500mg	500mg/錠
採用	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	75mg/錠
採用	ケアラム錠25mg	25mg/錠
採用	ケイツーシロップ0.2%	2mg1mL/包
採用	ケタスカプセル10mg	10mg/Cap
採用	ケフレックスカプセル250mg	250mg/Cap
採用	コートリル錠10mg	10mg/錠
採用	コートン錠25mg	25mg/錠
採用	コスパノンカプセル40mg	40mg/Cap
採用	コデインリン酸塩散1%「メタル」	10mg/g
採用	コニール錠4	4mg/錠
採用	コメリアンコーワ錠50	50mg/錠
採用	コランチル配合顆粒	1g/包
採用	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg/錠
採用	コロネル細粒83.3%	500mg0.6g/包
採用	コントミン糖衣錠25mg	25mg/錠
採用	コンバントリンドライシロップ100mg	100mg/包 (1g)
採用	サアミオン錠5mg	5mg/錠
採用	ザイザルシロップ0.05%	0.5mg/mL
採用	ザイティガ錠250mg	250mg/錠
採用	サイトテック錠200	200 μ g/錠
採用	サイレース錠1mg	1mg/錠
採用	サインバルタカプセル20mg	20mg/Cap
採用	サムスカOD錠15mg	15mg/錠
採用	サムスカOD錠7.5mg	7.5mg/錠
採用	サムチレール内用懸濁液15%	750mg5mL/包
採用	サラジェン錠5mg	5mg/錠
採用	サラゾピリン錠500mg	500mg/錠
採用	サリグレンカプセル30mg	30mg/Cap
採用	サワシリン細粒10%	100mg/g
採用	ジェイゾロフトOD錠50mg	50mg/錠
採用	ジェニナック錠200mg	200mg/錠
採用	ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	1mg/錠
採用	シクレスト舌下錠5mg	5mg/錠
採用	シクロスポリン25mgカプセル「サンド」	25mg/Cap

採用	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	25mg/錠
採用	ジゴシン散0.1%	1mg/g
採用	ジゴシン錠0.25mg	0.25mg/錠
採用	ジスロマック細粒小児用10%	100mg/g
採用	ジスロマック錠250mg	250mg/錠
採用	シナール配合顆粒	1g/包
採用	ジフルカンカプセル100mg	100mg/Cap
採用	ジブレキサザイディス錠5mg	5mg/錠
採用	ジブレキサ細粒1%	10mg/g
採用	ジブレキサ錠2.5mg	2.5mg/錠
採用	シプロキササン錠200mg	200mg/錠
採用	シベノール錠100mg	100mg/錠
採用	ジャディアンス錠10mg	10mg/錠
採用	ジャヌビア錠50mg	50mg/錠
採用	シュアポスト錠0.25mg	0.25mg/錠
採用	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	50mg/錠
採用	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	4mg/錠
採用	シングレアOD錠10mg	10mg/錠
採用	シングレアチュアブル錠5mg	5mg/錠
採用	シンメトレル細粒10%	100mg/g
採用	シンメトレル錠50mg	50mg/錠
採用	スインプロイク錠0.2mg	0.2mg/錠
採用	スーグラ錠50mg	50mg/錠
採用	スタラシドカプセル100	100mg/Cap
採用	ストラテラカプセル5mg	5mg/Cap
採用	ストロメクトール錠3mg	3mg/錠
採用	スパカール錠40mg	40mg/錠
採用	スピロノラクトン錠25mg「テバ」	25mg/錠
採用	スピロベント錠10 μ g	10 μ g/錠
採用	ズファジラン錠10mg	10mg/錠
採用	セイブル錠50mg	50mg/錠
採用	セディール錠10mg	10mg/錠
採用	セバゾン錠1	1mg/錠
採用	セパミットーR細粒2%	20mg/g
採用	セファドール錠25mg	25mg/錠
採用	セファランチン錠1mg	1mg/錠
採用	セファランチン末1%	10mg/g
採用	セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」	100mg/錠
採用	セララ錠50mg	50mg/錠
採用	セルシン散1%	10mg/g
採用	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	100mg/錠
採用	セレジストOD錠5mg	5mg/錠
採用	セレニカR顆粒40%	400mg/g
採用	セレネース細粒1%	10mg/g
採用	セレネース錠1mg	1mg/錠
採用	セロクエル25mg錠	25mg/錠
採用	セロクエル細粒50%	500mg/g
採用	セロクラール錠20mg	20mg/錠
採用	セロケン錠20mg	20mg/錠
採用	センノシド錠12mg「武田テバ」	12mg/錠
採用	ソセゴン錠25mg	25mg/錠
採用	ソラナックス0.4mg錠	0.4mg/錠
採用	ソランタール錠100mg	100mg/錠
採用	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「杏林」	10mg/錠
採用	ダーブロック錠2mg	2mg/錠
採用	ダーブロック錠4mg	4mg/錠
採用	ダーブロック錠6mg	6mg/錠
採用	ダイアモックス錠250mg	250mg/錠

採用	ダイフェン配合顆粒	(400mg+80mg)/g
採用	ダイフェン配合錠	(400mg+80mg)/錠
採用	タウリン散98%「大正」	1g/包 (1.02g)
採用	ダクチル錠50mg	50mg/錠
採用	タグリッソ錠80mg	80mg/錠
採用	タケキャブ錠10mg	10mg/錠
採用	タケキャブ錠20mg	20mg/錠
採用	タナトリル錠5	5mg/錠
採用	タベンタ錠100mg	100mg/錠
採用	タベンタ錠25mg	25mg/錠
採用	タミフルカプセル75	75mg/Cap
採用	タミフルドライシロップ3%	30mg/g
採用	タモキシフェン錠10mg「DSEP」	10mg/錠
採用	ダラシンカプセル150mg	150mg/Cap
採用	タリージェ錠5mg	5mg/錠
採用	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	250mg/錠
採用	ダントリウムカプセル25mg	25mg/Cap
採用	タンニン酸アルブミンシオエ	末
採用	タンボコール錠50mg	50mg/錠
採用	チウラジール錠50mg	50mg/錠
採用	チガソнкаプセル10	10mg/Cap
採用	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg/錠
採用	チラーヂンS錠50 μ g	50 μ g/錠
採用	ソイミーグ錠500mg	500mg/錠
採用	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）〔TJ-24〕	2.5g/包
採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-1〕	2.5g/包
採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）〔TJ-107〕	2.5g/包
採用	ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）〔TJ-17〕	2.5g/包
採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-100〕	2.5g/包
採用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-16〕	2.5g/包
採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-14〕	2.5g/包
採用	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）〔TJ-126〕	2.5g/包
採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）〔TJ-54〕	2.5g/包
採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-43〕	2.5g/包
採用	ソルバダ配合錠	1錠
採用	ティーエスワン配合OD錠T20	20mg/錠（テガフル相当量）
採用	ティーエスワン配合OD錠T25	25mg/錠（テガフル相当量）
採用	ティーエスワン配合カプセルT20	20mg/Cap（テガフル相当量）
採用	ティーエスワン配合カプセルT25	25mg/Cap（テガフル相当量）
採用	デエビゴ錠2.5mg	2.5mg/錠
採用	デエビゴ錠5mg	5mg/錠
採用	テオドール錠100mg	100mg/錠
採用	デカドロンエリキシル0.01%	0.1mg/mL
採用	デカドロン錠0.5mg	0.5mg/錠
採用	デカドロン錠4mg	4mg/錠
採用	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩散10%「日医工」	100mg/g
採用	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」	15mg/錠
採用	テグレトール細粒50%	500mg/g
採用	テグレトール錠200mg	200mg/錠
採用	デザレックス錠5mg	5mg/錠
採用	テトラミド錠10mg	10mg/錠
採用	テネリアOD錠20mg	20mg/錠
採用	テノーミン錠25	25mg/錠
採用	デノタスチュアブル配合錠(SP包装)	1錠
採用	デバケンR錠200mg	200mg/錠
採用	デバケンシロップ5%	50mg/mL
採用	デパス細粒1%	10mg/g
採用	デフェラシクロス顆粒分包360mg「サンド」	360mg/包

採用	デフェラシクロス顆粒分包90mg「サンド」	90mg/包
採用	テプレノンカプセル50mg「トーワ」	50mg/Cap
採用	デプロメール錠25	25mg/錠
採用	テモゾロミド錠100mg「NK」	100mg/錠
採用	テモゾロミド錠20mg「NK」	20mg/錠
採用	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	0.5mg/Cap
採用	デュファストン錠5mg	5mg/錠
採用	テルネリン錠1mg	1mg/錠
採用	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	40mg/錠
採用	トアラセット配合錠「杏林」	1錠
採用	ドキサゾシン錠1mg「タナベ」	1mg/錠
採用	ドグマチール細粒10%	100mg/g
採用	ドグマチール錠50mg	50mg/錠
採用	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」	3mg/錠
採用	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」	5mg/錠
採用	ドバコール配合錠L100	1錠
採用	ドバストン散98.5%	985mg/g
採用	トビエース錠4mg	4mg/錠
採用	トピナ錠50mg	50mg/錠
採用	ドブス細粒20%	200mg/g
採用	トフラニール錠10mg	10mg/錠
採用	トラセミドOD錠8mg「TE」	8mg/錠
採用	トラゼンタ錠5mg	5mg/錠
採用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg/錠
採用	トラネキサム酸錠250mg「YD」	250mg/錠
採用	トラマールOD錠25mg	25mg/錠
採用	ドラマミン錠50mg	50mg/錠
採用	トリクロリールシロップ10%	100mg/mL
採用	トリプタノール錠10	10mg/錠
採用	トレドミン錠15mg	15mg/錠
採用	トレリーフOD錠25mg	25mg/錠
採用	ナイキサン錠100mg	100mg/錠
採用	ナウゼリンOD錠5	5mg/錠
採用	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg/錠
採用	ナトリックス錠1	1mg/錠
採用	ナフトビジルOD錠25mg「トーワ」	25mg/錠
採用	ナルサス錠2mg	2mg/錠
採用	ナルサス錠6mg	6mg/錠
採用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g「サワイ」	2.5 μ g/錠
採用	ナルラビド錠1mg	1mg/錠
採用	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	100mg/g
採用	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5mg/錠
採用	ニトロベン舌下錠0.3mg	0.3mg/錠
採用	ニフェジピンCR錠20mg「NP」	20mg/錠
採用	ニボラジン錠3mg	3mg/錠
採用	ニューロタン錠50mg	50mg/錠
採用	ネキシウムカプセル20mg	20mg/Cap
採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	20mg/包
採用	ノイロトロピン錠4単位	4単位/錠
採用	ノウリアスト錠20mg	20mg/錠
採用	ノクサフィル錠100mg	100mg/錠
採用	ノバミン錠5mg	5mg/錠
採用	ノベルジン錠50mg	50mg/錠
採用	ハーフジゴキシンKY錠0.125	0.125mg/錠
採用	パーロデル錠2.5mg	2.5mg/錠
採用	バイアスピリン錠100mg	100mg/錠
採用	ハイコパールカプセル500 μ g	500 μ g/Cap
採用	ハイドレアカプセル500mg	500mg/Cap

採用	パキロビッドパック	1シート（淡赤色錠（4錠）及び白色錠（2錠）の2種類のフィルムコーティング錠からなる6錠の製剤）
採用	パップフォー錠10	10mg/錠
採用	バラクルード錠0.5mg	0.5mg/錠
採用	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	500mg/錠
採用	バラシクロビル顆粒50%「SPKK」	500mg/g
採用	パラミゼンカプセル300mg	300mg/Cap
採用	バルサルタン錠80mg「サンド」	80mg/錠
採用	パルモディア錠0.1mg	0.1mg/錠
採用	バレイショデンプン「ケンエー」	500g/個
採用	パロキセチン錠10mg「SPKK」	10mg/錠
採用	バンコマイシン散0.5g「OK」	0.5g/瓶
採用	パントシン散20%	200mg/包（1g）
採用	ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	15mg/錠
採用	ピオフェルミンR錠	6mg/錠
採用	ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」	80mg/錠
採用	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「トーワ」	0.75%10mL/本
採用	ヒスロンH錠200mg	200mg/錠
採用	ヒスロン錠5	5mg/錠
採用	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	0.625mg/錠
採用	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「テバ」	5mg/錠
採用	ビタミンB6散10%「マルイシ」	10%100mg/g
採用	ビタメジン配合カプセルB25	Cap
採用	ヒダントール錠100mg	100mg/錠
採用	ピドキサール錠10mg	10mg/錠
採用	ビピアント錠20mg	20mg/錠
採用	ビプラマイシン錠50mg	50mg/錠
採用	ビムパット錠50mg	50mg/錠
採用	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg/錠
採用	ピラマイド原末	末
採用	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	25mg/Cap
採用	ピレチア細粒10%	100mg/g
採用	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	20mg/錠
採用	ファロムドライシロップ小児用10%	100mg/g
採用	ファロム錠200mg	200mg/錠
採用	ファンギゾンシロップ100mg/mL	（100mg/mL）24mL/瓶
採用	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	60mg/錠
採用	フェノバール散10%	100mg/g
採用	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	20mg/錠
採用	フォシーガ錠10mg	10mg/錠
採用	フォシーガ錠5mg	5mg/錠
採用	フォリアミン錠	5mg/錠
採用	プロラム口腔用液5mg	5mg/本
採用	ブスコバン錠10mg	10mg/錠
採用	プラケニル錠200mg	200mg/錠
採用	プラザキサカプセル110mg	110mg/Cap
採用	プラザキサカプセル75mg	75mg/Cap
採用	フラジール内服錠250mg	250mg/錠
採用	プラノバール配合錠	1錠
採用	フランドル錠20mg	20mg/錠
採用	フリウェル配合錠LD「あすか」	1錠
採用	プリモボラン錠5mg	5mg/錠
採用	プリンベランシロップ0.1%	1mg/mL
採用	プリンベラン錠5	5mg/錠
採用	フルイトラン錠2mg	2mg/錠
採用	プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	25mg/錠
採用	プレディニン錠50	50mg/錠
採用	プレドニゾロン散「タケダ」1%	10mg/g

採用	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	5mg/錠
採用	プレドニゾロン錠1mg（旭化成）	1mg/錠
採用	プレマリン錠0.625mg	0.625mg/錠
採用	プロカテロール塩酸塩シロップ5 μ g/mL「日新」	5 μ g/mL
採用	プログラフカプセル0.5mg	0.5mg/Cap
採用	プログラフカプセル1mg	1mg/Cap
採用	プロサイリン錠20	20 μ g/錠
採用	プロセキソール錠0.5mg	0.5mg/錠
採用	フロセミド細粒4%「EMEC」	40mg/g
採用	フロセミド錠40mg「NIG」	40mg/錠
採用	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	0.25mg/錠
採用	プロテカジンOD錠10	10mg/錠
採用	プロナンセリン錠4mg「DSPB」	4mg/錠
採用	フロベン顆粒8%	40mg/0.5g
採用	フロリードゲル経口用2%	(20mg/g) 5g/本
採用	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg/錠
採用	ベサコリン散5%	50mg/g
採用	ベスタチンカプセル30mg	30mg/Cap
採用	ベタナミン錠25mg	25mg/錠
採用	ベタニス錠50mg	50mg/錠
採用	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	0.5mg/錠
採用	ベネット錠17.5mg	17.5mg/錠
採用	ヘバアクト配合顆粒	4.5g/包
採用	ベプリコール錠50mg	50mg/錠
採用	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」	10mg/錠
採用	ヘマンジオールシロップ小児用0.375%	120mL/瓶
採用	ベムリディ錠25mg	25mg/錠
採用	ペリアクチンシロップ0.04%	0.4mg/mL
採用	ペリアクチン散1%	10mg/g
採用	ペリアクチン錠4mg	4mg/錠
採用	ペリチーム配合顆粒	1g/包
採用	ペルサンチン錠100mg	100mg/錠
採用	ベルソムラ錠15mg	15mg/錠
採用	ベルソムラ錠20mg	20mg/錠
採用	ヘルベッサーRカプセル100mg	100mg/Cap
採用	ヘルベッサー錠30	30mg/錠
採用	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	4mg/錠
採用	ベンザリン錠5	5mg/錠
採用	ペンタサ錠500mg	500mg/錠
採用	ボグリボース錠0.3mg「武田テバ」	0.3mg/錠
採用	ホスミシンドライシロップ400	400mg/g
採用	ホスミシン錠500	500mg/錠
採用	ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	75mg/錠
採用	ポリコナゾール錠50mg「トーワ」	50mg/錠
採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	5g25g/個
採用	ホリナート錠25mg「タイホウ」	25mg/錠
採用	ポルトラック原末	6g/包
採用	ボンゾール錠100mg	100mg/錠
採用	マイスタン細粒1%	10mg/g
採用	マイテラーゼ錠10mg	10mg/錠
採用	マクサルトRPD錠10mg	10mg/錠
採用	マグミット錠250mg	250mg/錠
採用	マグミット錠330mg	330mg/錠
採用	ミオナール錠50mg	50mg/錠
採用	ミグシス錠5mg	5mg/錠
採用	ミニリンメルトOD錠120 μ g	120 μ g/錠
採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」	50mg/錠
採用	ミノマイシン顆粒2%	20mg/g

採用	ミヤBM細粒	40mg/g
採用	ミヤBM錠	20mg/錠
採用	ミラベックスLA錠0.375mg	0.375mg/錠
採用	ミラベックスLA錠1.5mg	1.5mg/錠
採用	メイアクトMS小児用細粒10%	100mg/g
採用	メイラックス錠1mg	1mg/錠
採用	メキシチールカプセル100mg	100mg/Cap
採用	メサペイン錠5mg	5mg/錠
採用	メジコン配合シロップ	500mL/瓶
採用	メスチノン錠60mg	60mg/錠
採用	メントレキセート錠2.5mg	2.5mg/錠
採用	メチコパール細粒0.1%	500 μ g0.5g/包
採用	メチコパール錠500 μ g	500 μ g/錠
採用	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	0.125mg/錠
採用	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」	250mg/錠
採用	メトリジン錠2mg	2mg/錠
採用	メパロチン錠10	10mg/錠
採用	メプチンドライシロップ0.005%	50 μ g/g
採用	メプチン錠50 μ g	50 μ g/錠
採用	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	5mg/錠
採用	メリスロン錠6mg	6mg/錠
採用	メルカゾール錠5mg	5mg/錠
採用	モービック錠10mg	10mg/錠
採用	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	5mg/錠
採用	モビコール配合内用剤LD	6.8523g/包
採用	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg/錠
採用	ユーエフティE配合顆粒T150	0.75g/包
採用	ユーエフティ配合カプセルT100	Cap
採用	ユベラNカプセル100mg	100mg/Cap
採用	ユベラ錠50mg	50mg/錠
採用	ユリノーム錠50mg	50mg/錠
採用	ヨウ化カリウム「ホエイ」	末
採用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg/丸
採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	65% 650mg/mL
採用	ラゲブリオカプセル200mg	200mg/Cap
採用	ラコールNF配合経腸用半固形剤	300g/バッグ
採用	ラストットSカプセル25mg	25mg/Cap
採用	ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」	10mg/錠
採用	ラミクタール錠25mg	25mg/錠
採用	ラミシール錠125mg	125mg/錠
採用	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	8mg/錠
採用	ランドセン細粒0.1%	1mg/g
採用	ランドセン錠0.5mg	0.5mg/錠
採用	リアルダ錠1200mg	1200mg/錠
採用	リーゼ錠5mg	5mg/錠
採用	リウマトレックスカプセル2mg	2mg/Cap
採用	リクシアナOD錠30mg	30mg/錠
採用	リザベンカプセル100mg	100mg/Cap
採用	リスパダールOD錠1mg	1mg/錠
採用	リスパダール細粒1%	10mg/g
採用	リスパダール内用液1mg/mL	0.5mL/包
採用	リスパダール内用液1mg/mL	1mL/包
採用	リスパダール内用液1mg/mL	2mL/包
採用	リスミー錠2mg	2mg/錠
採用	リズミック錠10mg	10mg/錠
採用	リスマダンR錠150mg	150mg/錠
採用	リパクレオンカプセル150mg	150mg/Cap
採用	リファンピシカプセル150mg「サンド」	150mg/Cap

採用	リフキシマ錠200mg	200mg/錠
採用	リフレックス錠15mg	15mg/錠
採用	リベルサス錠3mg	3mg/錠
採用	リボバス錠5	5mg/錠
採用	リマチル錠100mg	100mg/錠
採用	リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」	5 μ g/錠
採用	リルゾール錠50mg「AA」	50mg/錠
採用	リンゼス錠0.25mg	0.25mg/錠
採用	リンデロン散0.1%	1mg/g
採用	ルパフィン錠10mg	10mg/錠
採用	ルリッド錠150	150mg/錠
採用	レイボー錠100mg	100mg/錠
採用	レキソタン細粒1%	10mg/g
採用	レキソタン錠2	2mg/錠
採用	レキップCR錠2mg	2mg/錠
採用	レクサブロ錠10mg	10mg/錠
採用	レクチゾール錠25mg	25mg/錠
採用	レスタミンコーワ錠10mg	10mg/錠
採用	レスピア静注・経口液60mg	(カフェインクエン酸塩として) 60mg3mL/V
採用	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	2.5mg/錠
採用	レナデックス錠4mg	4mg/錠
採用	レニベース錠5	5mg/錠
採用	レバミピド錠100mg「タナベ」	100mg/錠
採用	レボセチリジン塩酸塩錠5mg	5mg/錠
採用	レボトミン散10%	100mg/g
採用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg/錠
採用	レルミナ錠40mg	40mg/錠
採用	ロイケリン散10%	100mg/g
採用	ロートエキス散「ケンエー」	100mg/g
採用	ロキソニン細粒10%	100mg/g
採用	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	60mg/錠
採用	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	2.5mg/錠
採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	1mg/Cap
採用	ロルカム錠4mg	4mg/錠
採用	ワーファリン錠1mg	1mg/錠
採用	ワーファリン顆粒0.2%	2mg/g
採用	ワイパックス錠1.0	1mg/錠
採用	ワソラン錠40mg	40mg/錠
採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	末
採用	塩酸アンプロキシオール錠15mg「杏林」	15mg/錠
採用	経口用トロンビン細粒1万単位	10,000単位/包 (1g)
採用	単シロップシオエ	mL
採用	炭酸リチウム錠200mg「大正」	200mg/錠
採用	炭酸水素ナトリウムシオエ	末
採用	調剤用バンビタン末	末
採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg/錠
採用	乳酸カルシウム「ケンエー」	細粒
採用	乳糖「ホエイ」	EFC (倍散用結晶)
採用 (外)	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	(g)
採用 (外)	MS温シップ「タイハウ」	10cm×14cm(20g)/枚 (1袋:5枚)
採用 (外)	MS冷シップ「タイハウ」	14cm×20cm(40g)/枚 (1袋:5枚)
採用 (外)	SPトローチ0.25mg「明治」	0.25mg/錠
採用 (外)	アイファガン点眼液0.1%	(1mg/mL) 5mL/本
採用 (外)	アクアチムローション1%	(10mg/mL) 20mL/瓶
採用 (外)	アクトシン軟膏3%	(30mg/g) 30g/本
採用 (外)	アズノールうがい液4%	(40mg/mL) 5mL/本
採用 (外)	アズノール軟膏0.033%	20g/本, (g)
採用 (外)	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「シオエ」	200mg/個

採用 (外)	アドエア100ディスカス60吸入用	60プリスター/キット
採用 (外)	アドフィードパップ40mg	40mg12g/枚(10cm×14cm/枚)(1袋：7枚)
採用 (外)	アトラント外用液1%	(10mg/mL) 10mL/本
採用 (外)	アノーロエリプタ7吸入用	7吸入/キット
採用 (外)	アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g	25 μ g/錠
採用 (外)	アラセナーA軟膏3%	(30mg/g) 2g/本
採用 (外)	アルピニー坐剤100	100mg/個
採用 (外)	アルメタ軟膏	(1mg/g) 5g/本
採用 (外)	アレジオン点眼液0.05%	0.05%5mL/本
採用 (外)	アンベック坐剤10mg	10mg/個
採用 (外)	アンベック坐剤30mg	30mg/個
採用 (外)	イオウ・カンフルローション「東豊」	500mL/瓶
採用 (外)	イソジンシュガーパスタ軟膏	100g/本
採用 (外)	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg/キット
採用 (外)	インタール吸入液1%	20mg2mL/管
採用 (外)	インテバンクリーム1%	(10mg/g) 50g/本
採用 (外)	ウルティプロ吸入用カプセル	1Cap
採用 (外)	エキザルベ	5g/本
採用 (外)	エコリシン眼軟膏	3.5g/本
採用 (外)	エストラーナテープ0.72mg	0.72mg/1枚(9cm ²)
採用 (外)	エナジア吸入用カプセル高用量(7Cap/枚)	1Cap
採用 (外)	エムラクリーム	5g/本
採用 (外)	エンベシド腔錠100mg	100mg/錠
採用 (外)	オイラックスクリーム10%	(100mg/g) 10g/本
採用 (外)	オキサロールローション25 μ g/g	(25 μ g/g) 10g/本
採用 (外)	オキサロール軟膏25 μ g/g	(25 μ g/g) 10g/本
採用 (外)	オキナゾール腔錠600mg	600mg/錠
採用 (外)	オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用	11.2mg3.3g/缶 56回(1回吸入量：200 μ g)
採用 (外)	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	(1mg/mL) 5mL/本
採用 (外)	キサラタン点眼液0.005%	0.005%2.5mL/本
採用 (外)	キューパール100エアゾール	15mg8.7g/缶(1回の噴霧主薬量：100 μ g)
採用 (外)	グラナテック点眼液0.4%	0.4%5mL/本
採用 (外)	クラビット点眼液1.5%	(15mg/mL) 5mL/本
採用 (外)	クロマイ腔錠100mg	100mg/錠
採用 (外)	ゲーベンクリーム1%	1%50g/本 (10mg/g)
採用 (外)	ケトプロフェンテープ40mg「SN」	40mg 1.4g/枚(10cm×14cm/枚)(1袋：7枚)
採用 (外)	コールタイジン点鼻液	15mL/本
採用 (外)	コソプトミニ配合点眼液	0.4mL/個
採用 (外)	コソプト配合点眼液	5mL/本
採用 (外)	ザーネ軟膏0.5%	5mg/g
採用 (外)	サイプレジン1%点眼液	(10mg/mL) 10mL/本
採用 (外)	ザジテン点鼻液0.05%	4.398mg8mL/瓶
採用 (外)	ザラカム配合点眼液	2.5mL/本
採用 (外)	サリベートエアゾール	50g/缶
採用 (外)	サルタノールインヘラー100 μ g	0.16%13.5mL/本
採用 (外)	サレックス軟膏0.05%	0.05%5g/本
採用 (外)	サンピロ点眼液2%	(20mg/mL) 5mL/瓶
採用 (外)	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	500mg・10mL/本
採用 (外)	ジクロード点眼液0.1%	(1mg/mL) 5mL/本
採用 (外)	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	25mg/個
採用 (外)	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	50mg/個
採用 (外)	ジフルブレドナートクリーム0.05%「イワキ」	(0.5mg/g) 5g/本
採用 (外)	ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」	(0.5mg/g) 5g/本
採用 (外)	スピオルトレスピマット28吸入	28吸入/キット
採用 (外)	スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入	2.5 μ g60吸入/キット
採用 (外)	セクターローション3%	3%50mL/本
採用 (外)	セルタッチパップ70	70mg14.0g/枚(10cm×14cm/枚)(1袋：7枚)
採用 (外)	セレベント50ディスカス	50 μ g/プリスター・60プリスター/キット

採用（外）	ゾピラックス眼軟膏3%	(30mg/g) 5g/本
採用（外）	ダイアコート軟膏0.05%	(0.5mg/g) 5g/本
採用（外）	ダイアップ坐剤4	4mg/個
採用（外）	ダイアップ坐剤6	6mg/個
採用（外）	タリビッド眼軟膏0.3%	(3mg/g) 3.5g/本
採用（外）	タリビッド耳科用液0.3%	(3mg/mL) 5mL/本
採用（外）	チモプトールXE点眼液0.5%	(5mg/mL) 2.5mL/瓶
採用（外）	チモプトール点眼液0.5%	(5mg/mL) 5mL/瓶
採用（外）	ディフェリングル0.1%	(1mg/g) 15g/本
採用（外）	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	1mg/g
採用（外）	テラ・コートリル軟膏	5g/本
採用（外）	テリルジー100エリプタ14吸入用	14吸入/キット
採用（外）	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」	1%10g/本
採用（外）	デルモベートクリーム0.05%	(0.5mg/g) 5g/本
採用（外）	デルモベートスカルプローション0.05%	(0.5mg/g) 10g/本
採用（外）	デルモベート軟膏0.05%	(0.5mg/g) 5g/本
採用（外）	トブシムローション0.05%	(0.5mg/g) 10g/本
採用（外）	トブラシン点眼液0.3%	(3mg/mL) 5mL/本
採用（外）	ドボネックス軟膏50 μ g/g	(50 μ g/g) 10g/本
採用（外）	トルソプト点眼液1%	(10mg/mL) 5mL/瓶
採用（外）	ドレニゾンテープ4 μ g/cm ²	(4 μ g/cm ³)7.5cm×10cm/枚
採用（外）	ナウゼリン坐剤10	10mg/個
採用（外）	ナウゼリン坐剤60	60mg/個
採用（外）	ナサニール点鼻液0.2%	10mg5mL/瓶
採用（外）	ニコチネルTTS10	(17.5mg) 10cm ² /枚
採用（外）	ニコチネルTTS20	(35mg) 20cm ² /枚
採用（外）	ニコチネルTTS30	(52.5mg) 30cm ² /枚
採用（外）	ニゾラルクリーム2%	(20mg/g) 10g/本
採用（外）	ニゾラルローション2%	(20mg/g) 10g/本
採用（外）	ネオシネジンコーワ5%点眼液	(50mg/mL) 10mL/本
採用（外）	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	(1mg/g) 5g/本
採用（外）	ネリゾナ軟膏0.1%	(1mg/g) 5g/本
採用（外）	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	(20mg/g) 3g/本
採用（外）	バルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入	22.4mg/本(1吸入量：200 μ g)
採用（外）	バルミコート吸入液0.25mg	0.25mg2mL/管
採用（外）	ハルロピテープ24mg	24mg/枚
採用（外）	ハルロピテープ32mg	32mg/枚
採用（外）	ハルロピテープ8mg	8mg/枚
採用（外）	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	(1mg/mL) 5mL/瓶
採用（外）	ヒアレインミニ点眼液0.3%	(3mg/mL) 0.4mL/本
採用（外）	ビソノテープ4mg	4mg/枚
採用（外）	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	56吸入/キット
採用（外）	フィブラストスプレー500	500 μ g/瓶(溶解液付)
採用（外）	フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ1mg「テイコク」	1mg/枚
採用（外）	フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ2mg「テイコク」	2mg/枚
採用（外）	フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ4mg「テイコク」	4mg/枚
採用（外）	フェントステープ0.5mg	0.5mg/枚
採用（外）	フシジンレオ軟膏2%	(20mg/g) 10g/本
採用（外）	ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	60吸入/キット
採用（外）	フラジール錠錠250mg	250mg/錠
採用（外）	プラスチベース	g
採用（外）	プリビナ液0.05%	0.5mg/mL
採用（外）	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	(10mg/mL) 5mL/本
採用（外）	フルタイド100ディスカス	100 μ g60ブリスター/個
採用（外）	フルタイド200ディスカス	200 μ g・60ブリスター/個
採用（外）	フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用	9.72mg10.6g/缶(1吸入量：50 μ g)
採用（外）	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	56吸入/瓶
採用（外）	フルメタ軟膏	(1mg/g) 5g/本

採用（外）	フルメトロン点眼液0.02%	(0.2mg/mL) 5mL/本
採用（外）	フルメトロン点眼液0.1%	(1mg/mL) 5mL/本
採用（外）	プレグランディン腔坐剤1mg	1mg/個
採用（外）	フロジン外用液5%	(50mg/mL) 30mL/本
採用（外）	プロスタンディン軟膏0.003%	(30 μ g/g) 30g/本
採用（外）	プロトピック軟膏0.03%小児用	(0.3mg/g) 5g/本
採用（外）	プロトピック軟膏0.1%	(1mg/g) 5g/本
採用（外）	プロナック点眼液0.1%	(1mg/mL) 5mL/本
採用（外）	プロペト	100g/本, (g)
採用（外）	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	0.2%45mL/本
採用（外）	ベストロン耳鼻科用1%	50mg5mL/本(溶解後)
採用（外）	ベストロン点眼用0.5%	(25mg5mL/瓶(溶解後の液として))
採用（外）	ベネトリン吸入液0.5%	(5mg/mL) 30mL/瓶
採用（外）	ベノキシール点眼液0.4%	(4mg/mL) 10mL/本
採用（外）	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	3.0mg/g 100g/本
採用（外）	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	3.0mg/g 25g/本
採用（外）	ペンタサ坐剤1g	1g/個
採用（外）	ペンタサ注腸1g	1g100mL/個
採用（外）	ポアラ軟膏0.12%	(1.2mg/g) 5g/本
採用（外）	ホーリンV腔用錠1mg	1mg/錠
採用（外）	ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg/枚
採用（外）	ホクナリンテープ2mg	2mg/枚
採用（外）	ホスミシンS耳科用3%	300mg10mL/本(溶解後)
採用（外）	ポビドンヨードガーグル7%「日医工」	7%30mL/本
採用（外）	ポビドンヨードゲル10%「明治」	10%4g/個 (100mg/g)
採用（外）	ボラザG軟膏	2.4g/個
採用（外）	ポルタレンゲル1%	(10mg/g) 50g/本
採用（外）	マクロゴール軟膏「ヨシダ」	500g/本
採用（外）	ミオコールスプレー0.3mg	(6.5mg/g) 7.2g (100回用) /缶
採用（外）	ミケランLA点眼液2%	(20mg/mL) 2.5mL/本
採用（外）	ミドリンM点眼液0.4%	5mL/本
採用（外）	ミドリンP点眼液	5mL/本
採用（外）	ムコフィリン吸入液20%	352.4mg2mL/包
採用（外）	メサデルム軟膏0.1%	0.1%5g/本
採用（外）	メブチンエア－10 μ g吸入100回	143 μ g/g 5mL/キット(1回噴霧中10 μ g)
採用（外）	メブチン吸入液ユニット0.5mL	100 μ g/mL (0.5mL/個)
採用（外）	モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」56噴霧	5mg10g/瓶
採用（外）	ヤクバンテープ20mg	20mg0.84g/枚(7cm×10cm/枚)(1袋：7枚)
採用（外）	リザベン点眼液0.5%	(5mg/mL) 5mL/瓶
採用（外）	リドメックスコーワローション0.3%	(3mg/g) 10g/本
採用（外）	リレンザ	(5mg/ブリスター) 4ブリスター/枚
採用（外）	リンデロン－VG軟膏0.12%	5g/本
採用（外）	リンデロン－Vローション	(1.2mg/mL) 10mL/瓶
採用（外）	リンデロン坐剤1.0mg	1mg/個
採用（外）	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	(1mg/mL) 5mL/瓶
採用（外）	ルリコン軟膏1%	1%10g/本
採用（外）	レスタミンコーワクリーム1%	1%500g/瓶
採用（外）	レルベア100エリブタ14吸入用	14吸入/キット
採用（外）	レルベア200エリブタ14吸入用	14吸入/キット
採用（外）	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	100mg2g/枚(10cm×14cm/枚)(1袋：7枚)
採用（外）	ロコイド軟膏0.1%	0.1%5g/本
採用（外）	ワコビタール坐剤100	100mg/個
採用（外）	ワコビタール坐剤50	50mg/個
採用（外）	亜鉛華（10%）単軟膏シオエ	g
採用（外）	眼・耳科用リンデロンA軟膏	5g/本
採用（外）	吸水クリーム「ニッコー」	g
採用（外）	強力ポステリザン（軟膏）	2g/個
採用（外）	硝酸イソソルビドテープ40mg「テイコク」	40mg/枚

採用（外）	新レシカルボン坐剤	2.6g/個
採用（外）	人工涙液マイティア点眼液	5mL/瓶
採用（外）	単軟膏	g
採用（外）	日点アトロピン点眼液1%	(10mg/mL) 5mL/瓶
採用（外）	尿素クリーム20%「SUN」	20%25g/本
採用（注）	5－FU注 1000mg/20mL	1000mg20mL/瓶
採用（注）	HCGモチダ注射用5千単位	5,000単位/管(溶解液付)
採用（注）	KCL注10mEqキット「テルモ」	0.7455g10mL/キット
採用（注）	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL/袋
採用（注）	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	2mg0.05mL/筒
採用（注）	アキネトン注射液5mg	5mg1mL/管
採用（注）	アクチバシン注2400万	2400万IU/瓶（溶解液付）
採用（注）	アクプラ静注用50mg	50mg/瓶
採用（注）	アクラシノン注射用20mg	20mg/瓶
採用（注）	アコアラン静注用1800	1800IU/瓶（溶解液付）
採用（注）	アシクロビル点滴静注用 250mg「サワイ」	250mg/瓶
採用（注）	アセリオ静注液1000mgバッグ	1,000mg100mL/袋
採用（注）	アタラックス－P注射液（25mg/ml）	25mg1mL/管
採用（注）	アデホス－Lコーワ注20mg	20mg2mL/管
採用（注）	アデラビン9号注1mL	1mL/管
採用（注）	アドナ注（静脈用）50mg	50mg10mL/管
採用（注）	アドナ注10mg	10mg2mL/管
採用（注）	アトニン－O注5単位	5単位1mL/管
採用（注）	アドリアシン注用10	10mg/瓶
採用（注）	アドリアシン注用50	50mg/瓶
採用（注）	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	1mg1mL/筒
採用（注）	アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」	0.5mg1mL/管
採用（注）	アネメトロ点滴静注液500mg	500mg/100mL/瓶
採用（注）	アネレム静注用50mg	50mg/瓶
採用（注）	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100mg4mL/瓶
採用（注）	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	400mg16mL/瓶
採用（注）	アブラキサン点滴静注用100mg	100mg/瓶
採用（注）	アプレゾリン注射用20mg	20mg/管
採用（注）	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg3mL/管
採用（注）	アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」	200mg/管
採用（注）	アミサリン注200mg	200mg2mL/管
採用（注）	アミノレバン点滴静注	500mL/袋
採用（注）	アミパレン輸液	200mL/袋
採用（注）	アムビゾーム点滴静注用50mg	50mg/瓶
採用（注）	アリナミン注射液10mg	10mg2mL/管
採用（注）	アリムタ注射用100mg	100mg/瓶
採用（注）	アリムタ注射用500mg	500mg/瓶
採用（注）	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	10mg20mL/管
採用（注）	アルツディスポ関節注25mg	25mg2.5mL/筒
採用（注）	アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「タカタ」	20 μ g/瓶
採用（注）	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 μ g「タカタ」	500 μ g/瓶
採用（注）	アロカリス点滴静注235mg	235mg10mL/瓶
採用（注）	アンサー皮下注20 μ g	20 μ g1mL/管(D-アラビノース換算糖含量として)
採用（注）	アンチレクス静注10mg	10mg1mL/管
採用（注）	アンベック注200mg	200mg5mL/管
採用（注）	イーケブラ点滴静注500mg	500mg5mL/瓶
採用（注）	イダマイシン静注用5mg	5mg/瓶
採用（注）	イノバン注0.3%シリンジ	150mg50mL/筒
採用（注）	イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg1.17mL/筒
採用（注）	イミグラン注3	3mg1mL/管
採用（注）	イムノブラダー膀注用80mg	80mg/瓶(溶解液付)
採用（注）	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ホスピーラ」	100mg5mL/瓶
採用（注）	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ホスピーラ」	40mg2mL/瓶

採用（注）	イルミア皮下注100mgシリンジ	100mg/1mL/筒
採用（注）	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」	300単位3mL/キット
採用（注）	インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」	300単位3mL/キット
採用（注）	インダシン静注用1mg	1mg/瓶
採用（注）	インデラル注射液2mg	2mg2mL/管
採用（注）	イントラリボス輸液20%	20%100mL/袋
採用（注）	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	100mg/瓶
採用（注）	ヴィーンF輸液	500mL/袋
採用（注）	ウロナーゼ静注用6万単位	60,000単位/瓶
採用（注）	エクザール注射用10mg	10mg/瓶
採用（注）	エスポー注射液750	750IU0.5mL/管
採用（注）	エスポー皮下用24000シリンジ	24,000IU0.5mL/筒
採用（注）	エスラックス静注50mg/5.0mL	50mg5mL/瓶
採用（注）	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」	30mg100mL/袋
採用（注）	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	100mg5mL/瓶
採用（注）	エナルモンデポー筋注250mg	250mg1mL/管
採用（注）	エピペン注射液0.3mg	2mg2mL/本（1回注射量0.3mL）
採用（注）	エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg/瓶
採用（注）	エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg/瓶
採用（注）	エホチール注10mg	10mg1mL/管
採用（注）	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	120mg1mL/シリンジ
採用（注）	エリル点滴静注液30mg	30mg2mL/管
採用（注）	エルシトニン注40単位	40エルカトニン単位1mL/管
採用（注）	エルネオパNF1号輸液	1000mL/袋
採用（注）	エルネオパNF1号輸液	1500mL/袋
採用（注）	エルネオパNF2号輸液	1000mL/袋
採用（注）	エルネオパNF2号輸液	1500mL/袋
採用（注）	エンタイビオ点滴静注300mg	300mg/瓶
採用（注）	オキサリプラチン注100mg/20mL「NK」	100mg/瓶
採用（注）	オキサリプラチン注200mg/40mL「NK」	200mg/瓶
採用（注）	オキサリプラチン注50mg/10mL「NK」	50mg/瓶
採用（注）	オキサロール注5 μ g	5 μ g1mL/管
採用（注）	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	10mg1mL/管
採用（注）	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」	100 μ g1mL/管
採用（注）	オザグレルNa静注液40mg「日医工」	40mg4mL/管
採用（注）	オニバイド点滴静注43mg	43mg10mL/瓶
採用（注）	オノアクト点滴静注用50mg	50mg/瓶
採用（注）	オビソート注射用0.1g	0.1g/管
採用（注）	オブジーポ点滴静注120mg/12mL	120mg12mL/瓶
採用（注）	オブジーポ点滴静注240mg/24mL	240mg24mL/瓶
採用（注）	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	20mg/瓶
採用（注）	オルガドロン注射液3.8mg	5mg1mL/管（デキサメタゾンとして3.8mg）
採用（注）	オンコビン注射用1mg	1mg/瓶
採用（注）	ガザイバ点滴静注1000mg	1000mg40mL/瓶
採用（注）	カドサイラ点滴静注用100mg	100mg/瓶
採用（注）	カドサイラ点滴静注用160mg	160mg/瓶
採用（注）	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	500mg/瓶
採用（注）	カルチコール注射液8.5%5mL	（85mg/mL）5mL/管
採用（注）	カルベニン点滴用0.5g	500mg/瓶
採用（注）	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	150mg15mL/瓶
採用（注）	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	450mg45mL/瓶
採用（注）	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg5mL/瓶
採用（注）	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	200mg/瓶
採用（注）	キイトルーダ点滴静注100mg	100mg4mL/瓶
採用（注）	キロサイドN注1g	1g50mL/瓶
採用（注）	キロサイド注200mg	200mg10mL/管
採用（注）	キロサイド注20mg	20mg1mL/管
採用（注）	キロサイド注60mg	60mg3mL/管

採用（注）	グラニセトン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」	3mg100mL/袋
採用（注）	グランシリンジM300	300 μ g0.7mL/筒
採用（注）	クリアクター静注用40万	40万IU/瓶
採用（注）	グリセレブ配合点滴静注	200mL/袋
採用（注）	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	600mg4mL/管
採用（注）	グルアセット35注	500mL/本
採用（注）	クレキサン皮下注キット2000IU	2000I.U.(抗第Xa因子活性)0.2mL/筒
採用（注）	ケイセントラ静注用1000	1000I.U./瓶(溶解液付)
採用（注）	ケイセントラ静注用500	500I.U./瓶(溶解液付)
採用（注）	ケイツーN静注10mg	10mg2mL/管
採用（注）	ケタラル静注用200mg	200mg20mL/瓶
採用（注）	ケナコルト－A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40mg1mL/瓶
採用（注）	ケナコルト－A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	50mg5mL/瓶
採用（注）	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」	12.5g50mL/瓶
採用（注）	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	12.5g250mL/瓶
採用（注）	ゲンタシン注60	60mg1.5mL/管
採用（注）	コートロシン注射用0.25mg	0.25mg/管(溶解液付)
採用（注）	コセンチクス皮下注150mgペン	150mg1mL/キット
採用（注）	ゴナックス皮下注用120mg	120mg/瓶（溶解液付き）
採用（注）	ゴナックス皮下注用240mg	240mg/瓶（溶解液付き）
採用（注）	ゴナックス皮下注用80mg	80mg/瓶（溶解液付き）
採用（注）	コントミン筋注10mg	10mg2mL/管
採用（注）	コンファクトF注射用500	500単位/瓶(溶解液付)
採用（注）	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg10mL/瓶
採用（注）	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg50mL/瓶
採用（注）	サイレース静注2mg	2mg1mL/管
採用（注）	サビーン点滴静注用500mg	500mg/瓶
採用（注）	サムタス点滴静注用8mg	8mg/瓶
採用（注）	サンラビン点滴静注用150mg	150mg/瓶
採用（注）	サンリズム注射液50	50mg5mL/管
採用（注）	ジースタ皮下注3.6mg	3.6mg0.36mL/筒
採用（注）	ジェノトロビンゴークイック注用12mg	12mg/キット
採用（注）	ジェノトロビンゴークイック注用5.3mg	5.3mg/キット
採用（注）	ジェムザール注射用1g	1g/瓶
採用（注）	ジェムザール注射用200mg	200mg/瓶
採用（注）	シオゾール注10mg	10mg1mL/管
採用（注）	ジギラノゲン注0.4mg	0.4mg2mL/管
採用（注）	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	10mg20mL/瓶
採用（注）	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」	25mg50mL/瓶
採用（注）	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	50mg100mL/瓶
採用（注）	ジスロマック点滴静注用500mg	500mg/瓶
採用（注）	シナジス筋注液100mg	100mg1.0mL/瓶
採用（注）	シナジス筋注液50mg	50mg0.5mL/瓶
採用（注）	ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」	10mg/管
採用（注）	シンビット静注用50mg	50mg/瓶
採用（注）	スキサメトニウム注40「マルイシ」	40mg2mL/管
採用（注）	スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL	150mg/1mL/筒
採用（注）	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	240万単位/筒
採用（注）	ズファジラン筋注5mg	5mg1mL/管
採用（注）	スミフェロン注DS300万IU	300万I.U.1mL/筒
採用（注）	スミフェロン注DS600万IU	600万I.U.1mL/筒
採用（注）	スルバシリン静注用1.5g	1.5g/瓶
採用（注）	スルバシリン静注用3g	3g/瓶
採用（注）	ゼピュディ点滴静注液500mg	500mg8mL/瓶
採用（注）	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	1g/キット(生理食塩液100mL付)
採用（注）	セファメジン α 注射用2g	2g/瓶
採用（注）	セファランチン注10mg	10mg2mL/管
採用（注）	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	1g/瓶

採用（注）	セフォタックス注射用1g	1g/瓶
採用（注）	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」	1g/キット（生理食塩液100mL付）
採用（注）	セフタジジム静注用1g「VTRS」	1g/瓶
採用（注）	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	1g/瓶
採用（注）	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	1g/瓶
採用（注）	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	1g/キット(生理食塩液100mL付)
採用（注）	ソセゴン注射液15mg	15mg1mL/A
採用（注）	ゾラデックス3.6mgデボ	3.6mg/筒(ゴセレリンとして)
採用（注）	ゾラデックスLA10.8mgデボ	10.8mg/筒(ゴセレリンとして)
採用（注）	ソリターT2号輸液	500mL/袋
採用（注）	ソルデム1輸液	200mL/袋
採用（注）	ソルデム1輸液	500mL/袋
採用（注）	ソルデム3A輸液	200mL/袋
採用（注）	ソルデム3A輸液	500mL/袋
採用（注）	ソルデム6輸液	500mL/袋
採用（注）	ソルメドロール注125mg	125mg/瓶(溶解液付)
採用（注）	ソルメドロール注40mg	40mg/瓶(溶解液付)
採用（注）	ソルメドロール注500mg	500mg/瓶(溶解液付)
採用（注）	ソルラクト輸液	500mL/袋
採用（注）	ゾレア皮下注150mgシリンジ	150mg1mL/キット
採用（注）	ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mLバッグ「VTRS」	4mg100mL/袋
採用（注）	ダイアモックス注射用500mg	500mg/瓶
採用（注）	ダウノマイシン静注用20mg	20mg/瓶
採用（注）	タケブロン静注用30mg	30mg/瓶
採用（注）	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	4.5g/瓶
採用（注）	タチオン注射用200mg	200mg/管
採用（注）	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	5,000低分子ヘパリンI.U.（抗第Xa因子活性）20mL/筒
採用（注）	ダルベポエチンアルファ注120 μ gシリンジ「KKF」	120 μ g0.5mL/筒
採用（注）	ダルベポエチンアルファ注30 μ gシリンジ「KKF」	30 μ g0.5mL/筒
採用（注）	ダルベポエチンアルファ注60 μ gシリンジ「KKF」	60 μ g0.5mL/筒
採用（注）	ダントリウム静注用20mg	20mg/瓶
採用（注）	チエナム点滴静注用キット0.5g	0.5g/キット
採用（注）	デクスメデトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」	200 μ g50mL/筒
採用（注）	デスフェラルール注射用500mg	500mg/瓶
採用（注）	テタノブリンIH静注1500単位	1500I.U.20mL/瓶
採用（注）	テタノブリンIH静注250単位	250I.U.3.4mL/瓶
採用（注）	デトキソール静注液2g	2g20mL/瓶
採用（注）	デノシン点滴静注用500mg	500mg/瓶
採用（注）	デボ・メドロール水懸注40mg	40mg1mL/瓶
採用（注）	デュピクセント皮下注300mgペン	300mg2mL/キット
採用（注）	テラルピシン注射用10mg	10mg/瓶
採用（注）	テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」	600 μ g/キット
採用（注）	ドキシル注20mg	20mg10mL/瓶
採用（注）	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	20mg1mL/瓶
採用（注）	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	80mg4mL/瓶
採用（注）	ドパストン静注50mg	50mg20mL/管
採用（注）	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」	100mg5mL/管
採用（注）	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	150mg/50mL/筒
採用（注）	ドブタミン点滴静注液100mg「F」	100mg5mL/管
採用（注）	トブラシン注60mg	60mg1.5mL/管
採用（注）	ドプラム注射液400mg	400mg20mL/瓶
採用（注）	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」	150mg/瓶
採用（注）	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」	60mg/瓶
採用（注）	トラネキサム酸注1g「NP」	1000mg10mL/管
採用（注）	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0.75mg0.5mL/キット
採用（注）	トレシーバ注フレックスタッチ	300単位/キット
採用（注）	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	100mg1mL/筒
採用（注）	ナファモスタット注射用10mg「SW」	10mg/瓶

採用（注）	ナファモスタット注射用50mg「SW」	50mg/瓶
採用（注）	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	0.2mg1mL/管
採用（注）	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	2mg2mL/管
採用（注）	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	12mg/瓶
採用（注）	ニトプロ持続静注液6mg	6mg2mL/管
採用（注）	ニトロール注5mgシリンジ	5mg10mL/筒
採用（注）	ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」	25mg50mL/筒
採用（注）	ネオアミュー輸液	200mL/袋
採用（注）	ネオシネジンコーワ注1mg	1mg1mL/管
採用（注）	ネオビタカイン注シリンジ5mL	5mL/筒
採用（注）	ネオファーゲン静注20mL	20mL/管
採用（注）	ネオフィリン注250mg	250mg10mL/管
採用（注）	ネस्प注射液120 μ gプラシリンジ	120 μ g0.5mL/筒
採用（注）	ネस्प注射液60 μ gプラシリンジ	60 μ g0.5mL/筒
採用（注）	ノイトロジン注100 μ g	100 μ g/瓶(溶解液付)
採用（注）	ノイロトロピン注射液3.6単位	3.6単位3mL/管
採用（注）	ノーベルパール静注用250mg	250mg/瓶
採用（注）	ノバントロン注10mg	10mg5mL/瓶
採用（注）	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	300単位3mL/筒
採用（注）	ノルアドリナリン注1mg	1mg1mL/管
採用（注）	ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg	10mg1.5mL/筒
採用（注）	パージェタ点滴静注420mg	420mg14mL/瓶
採用（注）	ハイカリックRF輸液500mL	500mL/袋
採用（注）	パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」	100mg16.7mL/瓶
採用（注）	パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」	30mg5mL/瓶
採用（注）	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	40mg1mL/管
採用（注）	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2,000単位100mL/瓶
採用（注）	ハベカシン注射液200mg	200mg4mL/管
採用（注）	パム静注500mg	500mg20mL/管
採用（注）	ハラヴェン静注1mg	1mg2mL/瓶
採用（注）	パルクス注10 μ g	10 μ g2mL/管
採用（注）	パルクス注5 μ g	5 μ g1mL/管
採用（注）	バル筋注100mg「AFP」	100mg1mL/管
採用（注）	パレプラス輸液	500mL/キット
採用（注）	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイハウ」	0.75mg50mL/袋
採用（注）	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	5mg1mL/管
採用（注）	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	0.5g/瓶
採用（注）	パントール注射液100mg	100mg1mL/管
採用（注）	ハンプ注射用1000	1,000 μ g/瓶
採用（注）	ヒアルロン酸Na関節注25mg「日新」	25mg2.5mL/管
採用（注）	ビーフリード輸液	500mL/袋
採用（注）	ピヴラッツ点滴静注液150mg	150mg6mL/瓶
採用（注）	ピクシリン注射用1g	1g/瓶
採用（注）	ピシバニール注射用5KE	5KE/瓶(溶解液付)
採用（注）	ビダーザ注射用100mg	100mg/瓶
採用（注）	ピタシミン注射液500mg	500mg2mL/管
採用（注）	ピタメジン静注用	瓶
採用（注）	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用300mg「NIG」	300mg/瓶(溶解液付)
採用（注）	ヒベルナ注25mg	25mg1mL/管
採用（注）	ビムパット点滴静注100mg	100mg10mL/管
採用（注）	ヒューマリンR注100単位/mL	1000単位10mL/瓶
採用（注）	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	40mg0.4mL/キット
採用（注）	ピンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	160mg/筒
採用（注）	ファモチジン注用20mg「トーフ」	20mg/管
採用（注）	フィジオ140輸液	500mL/袋
採用（注）	フィニバックス点滴静注用0.5g	0.5g/瓶
採用（注）	ブイフェンド200mg静注用	200mg/瓶
採用（注）	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	1g/瓶(溶解液付)

採用（注）	フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」	75 μ g0.3mL/筒
採用（注）	フェインジェクト静注500mg	500mg/10mL/瓶
採用（注）	フェジン静注40mg	鉄：40mg2mL/管
採用（注）	フェソロデックス筋注250mg	250mg5mL/筒
採用（注）	フェノバル注射液100mg	100mg1mL/管
採用（注）	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.1mg2mL/管
採用（注）	ブスコパン注20mg	20mg1mL/管
採用（注）	プラリア皮下注60mgシリンジ	60mg1mL/筒
採用（注）	プリズバインド静注液2.5g	2.5g50mL/瓶
採用（注）	ブリディオオン静注200mg	200mg2mL/瓶
採用（注）	プリンペラン注射液10mg	10mg2mL/管
採用（注）	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	0.5mg5mL/筒
採用（注）	フルマリンキット静注用1g	1g/キット(生食液100mL付)
採用（注）	フルマリン静注用1g	1g/瓶
採用（注）	プレアミン－P注射液	200mL/袋
採用（注）	プレオ注射用5mg	5mg/瓶
採用（注）	プレセデックス静注液200 μ g/50mLシリンジ「ファイザー」	200 μ g50mL/筒
採用（注）	プロゲホルモン筋注用25mg	25mg1mL/管
採用（注）	プロジフ静注液200	200mg2.5mL/瓶
採用（注）	プロスタルモン・F注射液1000	1mg1mL/管
採用（注）	プロタノールL注0.2mg	0.2mg1mL/管
採用（注）	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	100mg10mL/瓶
採用（注）	プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	0.732mg（プロチレリンとして0.5mg）1mL/管
採用（注）	ベクルリー点滴静注用100mg	100mg/瓶
採用（注）	ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」	20,000ヘパリン単位0.8mL/瓶
採用（注）	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	5,000単位5mL/瓶
採用（注）	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	5,000単位5mL/管
採用（注）	ベリナートP静注用500	500国際単位/瓶(溶解液付)
採用（注）	ベルジピン注射液25mg	25mg25mL/瓶
採用（注）	ホストイン静注750mg	750mg10mL/瓶
採用（注）	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	2g/瓶
採用（注）	ボスミン注1mg	1mg1mL/管
採用（注）	ボナロン点滴静注バッグ900 μ g	900 μ g100mL/袋
採用（注）	ボララミン注5mg	5mg1mL/管
採用（注）	ホリゾン注射液10mg	10mg2mL/管
採用（注）	ボルビックス注	2mL/管
採用（注）	ボルベン輸液6%	30g500mL/袋
採用（注）	ボンペンディ静注用1300	1300IU/瓶
採用（注）	マイトマイシン注用2mg	2mg/瓶
採用（注）	マグセント注100mL	100mL/瓶
採用（注）	マルタミン注射用	瓶
採用（注）	マンニトールS注射液	300mL/袋
採用（注）	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	50mg/瓶
採用（注）	ミダゾラム注10mg「サンド」	10mg2mL/管
採用（注）	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	60mg/筒
採用（注）	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	100mg/瓶
採用（注）	ミラクリッド注射液5万単位	50,000単位1mL/管
採用（注）	ミルセラ注シリンジ150 μ g	150 μ g0.3mL/筒
採用（注）	ミルセラ注シリンジ75 μ g	75 μ g0.3mL/筒
採用（注）	ミルリノン注射液10mg「F」	10mg10mL/瓶
採用（注）	メイロン静注8.4%	1.68g20mL/管，21g250mL/袋
採用（注）	メコバラミン注500 μ g「NP」	500 μ g1mL/管
採用（注）	メソトレキセート点滴静注液1000mg	1000mg40mL/瓶
採用（注）	メソトレキセート点滴静注液200mg	200mg8mL/瓶
採用（注）	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	0.2mg1mL/管
採用（注）	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	500mg/瓶
採用（注）	メロペネム点滴静注用1g「明治」	1g/瓶
採用（注）	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	10mg1mL/管

採用（注）	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	50mg5mL/管
採用（注）	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	300単位/キット
採用（注）	ラクトリンゲルM注「フソー」	500mL/袋
採用（注）	ラシックス注20mg	20mg2mL/管
採用（注）	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	0.5mg0.05mL/筒
採用（注）	ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	300mg60mL/袋(ペラミビルとして)
採用（注）	ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」	0.3mg2mL/管
採用（注）	ランマーク皮下注120mg	120mg1.7mL/瓶
採用（注）	リクラスト点滴静注液5mg	5mg100mL/瓶
採用（注）	リコモジュリン点滴静注用12800	12800単位/瓶
採用（注）	リスモダンP静注50mg	50mg5mL/管
採用（注）	リツキサン点滴静注100mg	100mg10mL/瓶
採用（注）	リツキサン点滴静注500mg	500mg50mL/瓶
採用（注）	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	100mg10mL/瓶
採用（注）	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	500mg50mL/瓶
採用（注）	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	100mg5mL/筒
採用（注）	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	2000mg200mL/袋
採用（注）	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	50mg5mL/A
採用（注）	リノロサル注射液4mg（0.4%）	4mg1mL/管
採用（注）	リメタゾン静注2.5mg	4mg1mL/管（デキサメタゾンとして2.5mg）
採用（注）	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg/キット
採用（注）	リュープリンSR注射用キット11.25mg	11.25mg/筒
採用（注）	リュープリン注射用キット3.75mg	3.75mg/筒
採用（注）	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」	1.88mg/筒
採用（注）	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	3.75mg/筒
採用（注）	リンデロン懸濁注	2.5mg0.5mL/管
採用（注）	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	20mL/管
採用（注）	ルムジェブ注ミリオペン	300単位3mL/キット
採用（注）	レバタン注0.2mg	0.2mg1mL/管
採用（注）	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」	100mg5mL/筒
採用（注）	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	500mg100mL/袋
採用（注）	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	100mg/瓶(レボホリナートとして)
採用（注）	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	25mg/瓶(レボホリナートとして)
採用（注）	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	2mg/瓶
採用（注）	ロイコボリン注3mg	3mg1mL/管
採用（注）	ロイナーゼ注用5000	5,000K.U./瓶
採用（注）	ロゼウス静注液40mg	40mg4mL/瓶
採用（注）	ロナプリーブ注射液セット1332	各1332mg11.1mL/瓶
採用（注）	ロナプリーブ注射液セット300	各300mg2.5mL/瓶
採用（注）	ロピオン静注50mg	50mg5mL/管
採用（注）	ワゴスチグミン注0.5mg	0.5mg1mL/管
採用（注）	ワソラン静注5mg	5mg2mL/管
採用（注）	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	40mg1mL/管
採用（注）	亜硝酸アミル「AFP」	0.25mL/管
採用（注）	塩化Na補正液2.5mEq/mL	2.922g(2.5mol/L)20mL/管
採用（注）	乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチャク」	1,000単位/瓶(溶解液5mL付)
採用（注）	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチャク」	200単位/瓶(溶解液1mL付)
採用（注）	献血アルブミン25%静注5g/20mL「ベネシス」	5g20mL/瓶
採用（注）	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	5g50mL/瓶
採用（注）	献血ベニロンーI静注用2500mg	2.5g/瓶(溶解液付)
採用（注）	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	1,000倍/瓶(溶解液付)
採用（注）	水溶性ヒドロコトロン注射液100mg	100mg2mL/瓶
採用（注）	水溶性プレドニン10mg	10mg/管
採用（注）	水溶性プレドニン50mg	50mg/管
採用（注）	生食注シリンジ「NP」	90mg・10mL/筒
採用（注）	静注用マグネゾール20mL	20mL/管
採用（注）	大塚蒸留水	20mL/管
採用（注）	大塚蒸留水	100mL/本

採用（注）	大塚生食注	20mL/管
採用（注）	大塚生食注	50mL/本
採用（注）	大塚生食注	100mL/本
採用（注）	大塚生食注	250mL/袋
採用（注）	大塚生食注	500mL/袋
採用（注）	大塚生食注2ポート100mL	100mL/本
採用（注）	大塚糖液10%	20mL/管（ブドウ糖2g：8kcal）
採用（注）	大塚糖液5%	20mL/管（ブドウ糖1g：4kcal）
採用（注）	大塚糖液5%	50mL/本（ブドウ糖2.5g：10kcal）
採用（注）	大塚糖液5%	100mL/本（ブドウ糖5g：20kcal）
採用（注）	大塚糖液5%	250mL/袋（ブドウ糖12.5g：50kcal）
採用（注）	大塚糖液5%	500mL/袋（ブドウ糖25g：100kcal）
採用（注）	大塚糖液50%	20mL/管（ブドウ糖10g：40kcal）
採用（注）	大塚糖液50%	200mL/袋（ブドウ糖100g：400kcal）
採用（注）	注射用イホマイド1g	1g/瓶
採用（注）	注射用エンドキサン500mg	500mg/瓶
採用（注）	注射用サイメリン50mg	50mg/瓶
採用（注）	注射用パニマイシン100mg	100mg/瓶
採用（注）	注射用フィルデシン1mg	1mg/瓶
採用（注）	注射用メソトレキセート50mg	50mg/瓶
採用（注）	注射用メソトレキセート5mg	5mg/瓶
採用（注）	低分子デキストランL注250mL1袋	250mL/袋
採用（注）	硫酸Mg補正液1mEq/mL	2.46g20mL/管(0.5mol/L)
採用（注）	硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	1g4mL/管
採用（注）	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	1g/瓶
処置	1%ディプリバン注－キット	500mg50mL/筒
処置	10%ハイポアルコール	10%500mL/本
処置	DTビック	0.1mL/瓶
処置	Dドライ透析剤3.0S	A剤：2682.0g・B剤：661.6g
処置	EOB・プリモビスト注シリンジ	1814.30mg10mL/筒
処置	LH－RH注0.1mg「タナベ」	0.1mg1mL/管
処置	N-マルチスティックスSG-L	100枚/缶
処置	TRH注0.5mg「タナベ」	0.5mg1mL/管
処置	アクトヒブ	瓶（溶解液付）
処置	アデノスキャン注60mg	60mg20mL/瓶
処置	アナペイン注7.5mg/mL	（7.5mg/mL）20mL/管
処置	アルギニン点滴静注30g「AY」	30g300mL/袋
処置	アロンアルファA「三共」	0.5g/管
処置	イオパミドール370注100mL「F」	75.52%100mL/筒(I：370mg/mL)
処置	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	75.52%100mL/筒(I：370mg/mL)
処置	イオパミロン注300	12.25g20mL/瓶(I：300mg/mL)
処置	イオパミロン注300	30.62g50mL/瓶(I：300mg/mL)
処置	イオパミロン注300	61.24g100mL/瓶(I：300mg/mL)
処置	イオパミロン注370シリンジ	75.52g100mL/筒(I：370mg/mL)
処置	イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」	64.71%100mL/筒(I：300mg/mL)
処置	イオメロン300注50mL	30.62g50mL/瓶(I：300mg/mL)
処置	イオメロン350注シリンジ135mL	71.44%135mL/筒(I：350mg/mL)
処置	イオメロン350注シリンジ75mL	71.44%75mL/筒(I：350mg/mL)
処置	イソゾール注射用0.5g	500mg/瓶(溶解液付)
処置	インピスト注240 10mL	10mL/瓶
処置	イモバックスポリオ皮下注	0.5mL/筒
処置	インジゴカルミン注20mg「AFP」	20mg5mL/管
処置	インフルエンザHAワクチン「第一三共」	1mL/瓶
処置	ウログラフィン注60%	60%20mL/管(I：292mg/mL)
処置	ウログラフィン注60%	60%100mL/瓶(I：292mg/mL)
処置	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	90g3L/袋
処置	ウロラブスティックス	100枚/缶
処置	エスクレ注腸用キット「500」	500mg/キット

処置	エタノールシオエ	(95.1～96.9vol%) 500mL/瓶
処置	エトキシスクレロール1%注射液	0.3g30mL/瓶
処置	エネマスター注腸散	98.1%400g/袋
処置	エムニケーター	30本/キット
処置	オキシドールシオエ	(2.5～3.5w/v%) 500mL/瓶
処置	オフサグリーン静注用25mg	25mg/瓶(溶解液付)
処置	オムニパーク240注10mL	5.177g10mL/瓶(I : 240mg/mL)
処置	オムニパーク300注シリンジ100mL	64.71g100mL/筒(I : 300mg/mL)
処置	オムニパーク350注100mL	75.49g100mL/瓶(I : 350mg/mL)
処置	オリブ油「ヨシダ」	(滅菌済) 60mL
処置	オリブ油「ヨシダ」	(滅菌済) 5mL
処置	オリブ油シオエ	500mL
処置	オルダミン注射用1g	1g10g/瓶
処置	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL/筒
処置	カーポスター透析剤・L	A液6L・B液7.6L
処置	ガストログラフィン経口・注腸用	100mL/瓶(I : 370mg/mL)
処置	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	60.47%7.5mL/筒
処置	乾燥BCGワクチン (経皮用・1人用)	12mg/管
処置	キシロカインゼリー2%	(20mg/mL) 30mL/本
処置	キシロカインビスカス2%	(20mg/mL) 100mL/瓶
処置	キシロカインポンプスプレー8%	(80mg/mL) 80g/瓶
処置	キシロカイン液「4%」	(40mg/mL) 100mL/瓶
処置	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン (1 : 100,000) 含有	100mg20mL/瓶
処置	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン (1 : 100,000) 含有	200mg20mL/瓶
処置	キシロカイン点眼液4%	(40mg/mL) 20mL/瓶
処置	クアトロバック皮下注シリンジ	0.5mL/筒
処置	クリアビュー EASY HCG	20テスト用
処置	グリセリンシオエ	500mL/瓶
処置	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL	120mL/個
処置	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」40mL	40mL/個
処置	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL	60mL/個
処置	グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg/瓶(溶解液付)
処置	グルテストNeoセンサー	30枚/箱
処置	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	2.5cm×5.1cm/枚 (綿型)
処置	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	7.6cm×10.2cm/枚 (ニューニット型)
処置	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	10.2cm×20.3cm/枚 (ガーゼ型)
処置	サーバリックス	0.5mL/筒
処置	サーファクテン気管注入用120mg	120mg/瓶
処置	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	2020mL/袋
処置	ザルコニン液0.05	0.05%1L/本
処置	ザルコニン液10	10w/v%500mL/本
処置	ジアグノグリーン注射用25mg	25mg/瓶(溶解液付)
処置	ジェービックV	0.5mL/瓶
処置	シェルガン0.5眼粘弾剤	0.5mL/筒
処置	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	300mL/瓶
処置	スープレックス吸入麻酔液	240mL/本
処置	スコピゾル眼科用液	15mL/本
処置	ステリクロンW液0.5	500mL/本
処置	スポンゼル	5cm×2.5cm/枚
処置	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	250mL/瓶
処置	ソナゾイド注射用16 μ L	16 μ L/瓶 (溶解液付)
処置	ソフラチュール貼付剤10cm	(10.8mg)10cm×10cm/枚
処置	タコシール組織接着用シート	9.5cm×4.8cm/枚
処置	テキサント消毒液6%	(6w/v%) 500g/本
処置	テトカイン注用20mg「杏林」	20mg/瓶
処置	テトラビック皮下注シリンジ	0.5mL/筒
処置	トレーランG液75g	75g225mL/瓶 (ブドウ糖として)
処置	ドロレプタン注射液25mg	25mg10mL/瓶

処置	トロンビン液モチダソフトボトル1万	10,000単位10mL/キット
処置	ニフレック配合内用剤	137.155g/袋
処置	ニューモパックスNPシリンジ	0.5mL/筒
処置	ハードファットS-55「マルイシ」	500g/個
処置	ハイジール消毒用液10%	10%500mL/本
処置	ハッカ水「ケンエー」	500mL/本
処置	ハッカ油「コザカイ・M」	20mL/瓶
処置	パッチテストパネル（S）	2枚/組
処置	バリコンミール	99%400g/本
処置	パロス発泡顆粒－S	4g/包
処置	ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「生化学」	6mg0.6mL/筒
処置	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	8.5mg0.85mL/筒
処置	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	（4.6mg/mL）20mL/瓶（希釈液480mLボトル付）
処置	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	（4.6mg/mL）20mL/瓶（希釈液480mLバッグ付）
処置	ビームゲン注0.25mL	5 μ g0.25mL/瓶
処置	ビームゲン注0.5mL	10 μ g0.5mL/瓶
処置	ヒトCRH静注用100 μ g「タナベ」	100 μ g/瓶（溶解液付）
処置	ピトレシン注射液20	20単位1mL/管
処置	ピュアラビング	83%250mL
処置	ピリスコピン点滴静注50	100mL/瓶（I：50mg/mL）
処置	フタール消毒液0.55%「ケンエー」	0.55%5L/本
処置	フルービックHAシリンジ	0.5mL/筒
処置	フルオレサイト静注500mg	500mg5mL/瓶
処置	プレベナー13水性懸濁注	0.5mL/筒
処置	プロウベス腔用剤10mg	10mg/個
処置	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	0.7mg/枚
処置	プロナーゼMS	20000単位0.5g/包
処置	プロハンス静注シリンジ13mL	3630.90mg13mL/筒
処置	プロピレングリコール	mL
処置	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	200mg20mL/管
処置	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	1,000単位10mL/筒
処置	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「フソー」	5,000ヘパリン単位20mL/筒
処置	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	5,000単位0.2mL/筒
処置	ヘプタバックス－Ⅱ水性懸濁注シリンジ0.25mL	0.25mL/筒
処置	ヘプタバックス－Ⅱ水性懸濁注シリンジ0.5mL	0.5mL/筒
処置	ベリプラストPコンビセット組織接着用	1mL2キット1組
処置	ベリプラストPコンビセット組織接着用	5mL2キット1組
処置	ボースデル内用液10	10mg250mL/袋（マンガンとして）
処置	ボスミン外用液0.1%	（1mg/mL）100mL/瓶
処置	ポビドンヨードガーグル7%「日医工」	7%250mL/本
処置	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	7.5%500mL/本（75mg/mL）
処置	ポビドンヨードフィールド外用液10%「明治」	10%250mL/本（100mg/mL）
処置	ポビドンヨード外用液10%「明治」	10%250mL/本（100mg/mL）
処置	ポプスカイン0.75%注150mg/20mL	150mg20mL/管
処置	ボルヒール組織接着用1mL	1mL4瓶1組
処置	ボルヒール組織接着用3mL	3mL4瓶1組
処置	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	20mg4mL/管
処置	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	20mg4mL/管
処置	マイクロシールドスクラブ液4%	4%500mL/本
処置	マキュエイド眼注用40mg	40mg/瓶
処置	マグコロール散68%分包100g	68g100g/包
処置	マグコロール散68%分包50g	34g50g/包
処置	マグネスコープ静注38%シリンジ15mL	5.65g15mL/筒（37.695%）
処置	メディセーフフィットチップ	30個/箱
処置	ユービット錠100mg	100mg/錠
処置	リドカインテープ18mg「YP」	（18mg）30.5mm×50.0mm/枚
処置	リドカイン塩酸塩注射液0.5%「VTRS」	25mg5mL/管
処置	リドカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」	100mg10mL/管

処置	リドカイン塩酸塩注射液2%「VTRS」	200mg10mL/管
処置	リピオドール480注10mL	10mL/管(I：480mg/mL)
処置	ロタリックス内用液	1.5mL/本
処置	一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用	0.25 μ g/瓶(溶解液付)
処置	塩酸メピバカイン注シリンジ0.5%「NP」	10mL/筒
処置	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	各6,000単位入/瓶(溶解液付)
処置	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	瓶(溶解液付)
処置	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	瓶(溶解液付)
処置	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	瓶(溶解液付)
処置	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	瓶(溶解液付)
処置	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」	0.5mL/瓶(溶解液付)
処置	逆性石ケン液0.025「ヨシダ」	0.025w/v%500mL/本
処置	血沈用チトラート「ハラサワ」液	3.8%/管（0.5mL）
処置	産婦人科用イソジンクリーム5%	(50mg/g) 250g/本
処置	消毒用エタノール液IP	(76.9～81.4vol%) 500mL/瓶
処置	生食注シリンジ「オーツカ」	45mg・5mL/筒
処置	生理食塩液「ヒカリ」	1L/本（広口開栓型）
処置	生理食塩液PL「フソー」	2L/バッグ
処置	生理食塩液バッグ「フソー」	1L/袋（ALタイプ）
処置	大塚蒸留水	500mL/本
処置	大塚生食注	500mL/本（細口開栓）
処置	中性緩衝ホルマリン水20	(35.0～38.0%100mL) 500mL/本
処置	注射用GHRP科研100	100 μ g/瓶(溶解液付)
処置	注射用水	1L/本
処置	沈降破傷風トキシイド「生研」	0.5mL/瓶
処置	無水エタノールシオエ	(99.5vol%以上) 500mL/瓶
処置	無水エタノール注「フソー」	5mL/管
処置	薬用炭「日医工」	末