消化器内科（胃癌）　Herceptin+XELOX(2回目以降)（2021／12～）

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		① 30 分で																
		ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg/50mL｢ﾀｲﾎｳ｣	1 袋															
		★ｵﾙｶﾞﾄﾛﾝ注 3.8mg/1mL	1 A															
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		② 90 分で 忍容性あれば30分で																
		生理食塩液注 250mL	1 袋															
		★60mg ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注用	6 mg /kg															
		注射用蒸留水 100mL	1 瓶															
		(溶解用)																
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		③ ⑤ オキサリプラチンの前後																
		生理食塩液注 50mL	1 瓶															
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		④ 120分で																
		5% ブドウ糖注 500mL	1 袋															
		★50mg/10mL ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注	130 mg /m²															
		★ｵﾙｶﾞﾄﾛﾝ注 3.8mg/1mL	1 A															
処方	1				●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
		妊禁)★ゼローダ錠 300mg	2000 mg /m²															
		分2:朝夕食後約30分 夕食後から服用																
ｺﾒﾝﾄ																		