消化器内科（胃癌）　Herceptin+XP(2回目以降)（2021／12～）

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		① ルートキープ																
		生理食塩液注 50mL	1 瓶															
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		② 90 分で 忍容性良好なら30分で																
		★60mg トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg /kg															
		生理食塩液注 250mL	1 袋															
		注射用蒸留水 100mL	1 瓶															
		(溶解用)																
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		③ 30 分で																
		パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タイホウ」	1 袋															
		アロカリス点滴静注235mg/10mL	1 V															
		★オルガトロン注 3.8mg/1mL	3 A															
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		④ 60 分で																
		ソルデム1輸液 500mL	1 袋															
		硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL	0.4 A															
		★KCL注10mEqキット「テルモ」 10mL	1 筒															
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		⑤ 30 分で																
		マンニットールS注射液 300mL	1 瓶															
	6	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		⑥ 全量で500mLになるように調製 60 分で																
		★10mg/20mL シスプラチン注「マルコ」	80 mg /m²															
		生理食塩液注 500mL	1 袋															
	7	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		⑦ 60 分で																
		ソルデム1輸液 500mL	1 袋															
		★KCL注10mEqキット「テルモ」 10mL	1 筒															
処方	1				●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
		妊禁)★ゼローダ錠 300mg	2000 mg /m²															
		分2:朝夕食後約30分 夕食後から服用																
ｺﾒﾝﾄ																		