分類	GpNα	薬剤/手技	投与量	点滴時間·速度	day(1)	day(8)	day(15
	N. Contraction						
	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		① 15 分で					
		生理食塩液注 100mL	1 瓶				
		★オルカドロン注 3.8mg/1mL	2 A				
		ファモチシン注射液 20mg/2mL「トーワ」(ガスター)	1 A				
		ホ°ララミン/主 5mg/1mL	1 A				
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		② 30 分で					
		ハッケッケッラニセトロン点、滴番注					
		3mg/100mL(カイドリル)	1袋				
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		(3) (5)					
		サイラムザの前後でフラッシュ					
		生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		④ フィルター必要60 分で					
		忍容性良好なら30分で					
		生理食塩液注 250mL	1 🛱				
注射		★100mg/10mL サイラムサジ主	8 mg/kg				
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		© 60 分で フィルター必要					
			4 41:				
		5%7	1 45				
	C	★30mg/5mL ハやリタキセル注「ホスと~う」	80 mg /m²		04887-		
	6	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		の 全開で					
		生理食塩液注 50mL	1瓶				
	7	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
		の 15 分で					
		生理食塩液注 100mL	1 瓶				
		★オルカトロン注 3.8mg/1mL	2 A				
		ファモチシン注射液 20mg/2mL「トーワ」(ガスター)	1 A				
		ポララミン注 5mg/1mL	1 A				
	8	DIV 点滴静注(サーフロー)	1.0			時間未定	
						- JIBN VAC	
		Ø 30 分で					
		バックツケラニセトロン点:滴請針注 3mg/100mL(カイトリル)	1袋				
	9	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
	Ů					MINNE	
		⑤分でフィルター必要					
		5%7斗ウ糖注 250mL(袋)(10/26~)	1袋				
		★30mg/5mL ハウリタキセル注「ホスピーラ」	80 mg /m²				
	10	DIV 点滴静注(サーフロー)	00 1115 7 111			時間未定	
		@				- JIBIPTONE	
		全開で					
		生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	11	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未
		① 15 分で					
		生理食塩液注 100mL	1 叛				
		★オルカトロン注 3.8mg/1mL	2 A				
		ファモチシン注射液 20mg/2mL「トーワ」(ガスター)	1 A				
		ホペララミンジ主 5mg/1mL	1 A				
	12	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未
		② 30 分で					
射							
		バックラグラニセトロン点:商請判注 3mg/100mL(カイトリル)	1 42				
	13	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未
		© ©					
		⑤ サイラムザの前後でフラッシュ					
		生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	14	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未
		② フィルター必要60 分で					
		50 分で 忍容性良好な630分で					
		生理食塩液注 250mL	1 🕸				
		★100mg/10mL サイラムサ汽主	8 mg /kg				
	15	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未
		® 60 分で					
		60 分で フィルター必要					
		5%7斗ウ糖注 250mL(袋)(10/26~)	1袋				
		★30mg/5mL ハウリタキセル注「ホスピーラ」	80 mg /m²				
	16	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未
		の 全闌で					
			1 瓶				
		生理食塩液注 50mL	1.88				