消化器内科（大腸癌）　Encorafenib+Binimetinib+Cet（初回）(2021／4～)

分類	GpNo	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
注射											
	1	IVH 埋込型力テーテルによるIVH			時間未定						
		① 30 分で									
		生理食塩液注 100mL	1 瓶								
		★オルガトロン注 3.8mg/1mL	2 A								
		ポララミン注 5mg/1mL	1 A								
	2	IVH 埋込型力テーテルによるIVH			時間未定						
		② ④ アービタックスの前後で									
		生理食塩液注 50mL	1 瓶								
		後の生食はアービタックスと同じ速度で									
	3	IVH 埋込型力テーテルによるIVH			時間未定						
		③ 全量で500mLになるように調製 120分で									
		生理食塩液注 500mL	1 袋								
		要時)★アービタックス注 100mg/20mL	400 mg /m²								
	4	IVH 埋込型力テーテルによるIVH			時間未定						
		ポートフラッシュ用									
		処置)生食注シリンジ「NP」10mL	1 筒								
処方											
	1				●	→	→	→	→	→	→
		要時)★メトピ錠 15mg	90 mg /Body								
		分2:朝夕食後約30分									
	2				●	→	→	→	→	→	→
		要時)★75mg ビラフトビカプセル	300 mg /Body								
		要時)★50mg ビラフトビカプセル	300 mg /Body								
		分1:朝食後約30分									
コメント											