消化器内科（大腸癌）　　ＴＡＳ＋Ｂｅｖ

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(15)
注射										
	1	DIV　点滴静注(サーフロー)			時間未定					
		① ③ アバスチンの前後で								
		生理食塩液注　50mL	1 瓶							
	2	DIV　点滴静注(サーフロー)			時間未定					
		② 全量で100mLになるように調整 初回90分　2回目60分　3回目30分								
		生理食塩液注 100mL	1 瓶							
		★100mg/4mL アバスチン注	5 mg /kg							
	3	DIV　点滴静注(サーフロー)								時間未定
		① ③ アバスチンの前後で								
		生理食塩液注　50mL	1 瓶							
	4	DIV　点滴静注(サーフロー)								時間未定
		② 全量で100mLになるように調整 初回90分　2回目60分　3回目30分								
		生理食塩液注 100mL	1 瓶							
		★100mg/4mL アバスチン注	5 mg /kg							
処方										
	1				●	→	→	→	→	
		要時・妊禁)★T20 ロンサーフ配合錠	2 錠							
		要時・妊禁)★T15 ロンサーフ配合錠	2 錠							
		分2:朝夕食後約30分 Day1～Day5								
	2				●	→	→	→	→	
		要時・妊禁)★T20 ロンサーフ配合錠	2 錠							
		要時・妊禁)★T15 ロンサーフ配合錠	2 錠							
		分2:朝夕食後約30分 Day8～Day12								
ｺﾒﾝﾄ										