消化器内科（大腸癌）　IRIS+Bev7.5mg(2022／2～)

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		① 30 分で																
		ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg/50mL「ﾀｲﾎｳ」	1 袋															
		★ｵﾙｶﾞﾄﾛﾝ注 3.8mg/1mL	2 A															
		ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ注 20mg/1mL	1 A															
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		② 90 分で																
		生理食塩液注 500mL	1 袋															
		★40mg/2mL ｲﾘﾉﾃｶﾝ注「NK」	150 mg /m²															
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		③ 全量で100mLになるように調製 初回90分 2回目60分 3回目以降30分																
		生理食塩液注 100mL	1 瓶															
		★100mg/4mL アバスチン注	7.5 mg /kg															
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		④ 全開で																
		生理食塩液注 50mL	1 瓶															
処方	1				●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
		妊禁)★T20 ｴｽﾜﾝﾀｲﾎｳ配合OD錠	4 錠 /Body															
		分2:朝夕食後約30分																
	2				●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
		妊禁)★T25 ｴｽﾜﾝﾀｲﾎｳ配合OD錠	4 錠 /Body															
		分2:朝夕食後約30分																
ｺﾒﾝﾄ																		