消化器内科（大腸癌）　Encorafenib+Binimetinib+Cet（2回目以降）(2021／4～)

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
注射	1	IVH 埋込型力テーテルによるIVH			時間未定													
		① 30 分で																
		生理食塩液注 100mL	1 瓶															
		★オルガトロン注 3.8mg/1mL	2 A															
		ポララミン注 5mg/1mL	1 A															
	2	IVH 埋込型力テーテルによるIVH			時間未定													
		② ④ アービタックスの前後で																
		生理食塩液注 50mL	1 瓶															
		後の生食はアービタックスと同じ速度で																
	3	IVH 埋込型力テーテルによるIVH			時間未定													
		③ 60 分で																
		生理食塩液注 250mL	1 袋															
		要時)★アービタックス注 100mg/20mL	250 mg /m²															
	4	IVH 埋込型力テーテルによるIVH			時間未定													
		ポートフラッシュ用																
		処置)生食注ｼﾘﾝｼﾞ｢NP｣10mL	1 筒															
	5	IVH 埋込型力テーテルによるIVH										時間未定						
		① 30 分で																
		生理食塩液注 100mL	1 瓶															
		★オルガトロン注 3.8mg/1mL	2 A															
		ポララミン注 5mg/1mL	1 A															
	6	IVH 埋込型力テーテルによるIVH										時間未定						
		② ④ アービタックスの前後で																
		生理食塩液注 50mL	1 瓶															
		後の生食はアービタックスと同じ速度で																
	7	IVH 埋込型力テーテルによるIVH										時間未定						
		③ 60 分で																
		生理食塩液注 250mL	1 袋															
		要時)★アービタックス注 100mg/20mL	250 mg /m²															
	8	IVH 埋込型力テーテルによるIVH										時間未定						
		ポートフラッシュ用																
		処置)生食注ｼﾘﾝｼﾞ｢NP｣10mL	1 筒															
処方	1				●	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶
		要時)★ﾒﾄﾋﾟﾁ錠 15mg	90 mg /Body															
		分2:朝夕食後約30分																
	2				●	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶
		要時)★75mg ﾋﾞﾗﾌﾄﾋﾞｶﾌﾟｾﾙ	300 mg /Body															
		要時)★50mg ﾋﾞﾗﾌﾄﾋﾞｶﾌﾟｾﾙ	300 mg /Body															
		分1:朝食後約30分																
ｺﾒﾝﾄ																		