消化器内科（胆道癌）　　Ｓ－１＋ＧＥＭ

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
注射	1	DIV　点滴静注(サーフロー)			時間未定							時間未定						
		① 30　分で																
		後・ﾊﾞｯｸﾞｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注 3mg/100mL(ｶｲﾄﾘ	1 袋															
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1mL	2 A															
	2	DIV　点滴静注(サーフロー)			時間未定							時間未定						
		② 30　分で																
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶															
		★ 200mg ジェムザール注	1000 mg /m²															
	3	DIV　点滴静注(サーフロー)			時間未定							時間未定						
		③ 全開で																
		生理食塩液注　50mL	1 瓶															
処方	1				●	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶
		【般】妊禁)★T20 ｴｽﾜﾝﾀｲﾎｳ配合OD錠	4 錠 /Body															
		【般】妊禁)★T25 ｴｽﾜﾝﾀｲﾎｳ配合OD錠	4 錠 /Body															
		分2:朝夕食後約30分																
ｺﾒﾝﾄ																		