

免疫血液内科 ホジキンリンパ腫 HL BV+AVD療法 (2020.3～)

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定
		① 30 分で			
		パック)カラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイトル)	1 袋		
		★40mg ソル・外注用注	1 瓶		
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定
		★イクザール注 10mg	6 mg /m ²		
		生理食塩液注 50mL	1 瓶		
		全開			
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定
		30 分で			
		★10mg アドリアシン注	25 mg /m ²		
		生理食塩液注 100mL	1 瓶		
4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
	1 時間で 遮光(レートも遮光)				
	要時)★ダカルバジン注 100mg	375 mg /m ²			
	200mL ソルテム3A輸液	1 袋			
5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
	フラッシュ用				
	生理食塩液注 50mL	1 瓶			
6	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
	30 分以上かけて				
	生理食塩液注 100mL	1 瓶			
	要時)★アトセトリス注 50mg	1.2 mg /kg			
	注射用蒸留水 20mL	2 A			
処方					
コメント		アトセトリスは最後に投与 ダカルバジンは遮光			