## 免疫血液内科 非ホジキンリンパ腫 GEM-P week1

分類	GpN₀.	薬剤/手技	投与量	点滴時間·速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)
注射	ø.							
	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定			
		0						
		バック")ケラニセトロン点:滴請利主 3mg/100mL(カイトリル)	1袋					
		★オルカドロン注 3.8mg/1mL	1 A					
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定			
		30 分で						
		5% ブドウ糖注 100mL	1瓶					
		★ 200mg ジェムサゲール/主	1000 mg/m²					
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	時間未定	時間未定	時間未定
		30 分で						
		生理食塩液注 100mL	1瓶					
		★オルカドロン注 3.8mg/1mL	40 mg					
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定			
		全量で500mLIになるように調整 120分で						
		生理食塩液注 500mL	1袋					
		★10mg/20mL シスプ <sup>®</sup> ラチン/主「マルコ」	75 mg/m²					
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定			
		60 分で						
		マンニットールS注射液 300mL	1 瓶					
処方								
<u> ۱۷</u> ۷۲								