

免疫血液内科 非ホジキンリンパ腫 NHL CHOP-R 1dayレジメン

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(3)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) ① パッククラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル) ★オルカトロン注 3.8mg/1mL	1 袋 1 A		時間未定	
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) 生理食塩液注 100mL ★500mg エンドキサン注 1時間で投与	1 瓶 750 mg /m ²		時間未定	
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) 生理食塩液注 100mL ★10mg アドリアシン注 1時間で投与	1 瓶 50 mg /m ²		時間未定	
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 生理食塩液注 50mL ★オンコヒン注 1mg 全開	1 瓶 1 mg /m ²		時間未定	
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) 生理食塩液注 100mL ★ハイドロコトロン注 100mg/2ml ホウラミン注 5mg/1mL リツキシマン前投薬	1 瓶 1 瓶 1 A		時間未定	
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) 生理食塩液注 500mL 後)★500mg/50mL リツキシマフBS注	450 ml 500 mg /Body		時間未定	
	7	DIV 点滴静注(サーフロー) 生理食塩液注 100mL 後)★100mg/10mL リツキシマフBS注	90 ml 100 mg /Body		時間未定	
	8	DIV 点滴静注(サーフロー) 生理食塩液注 100mL 後)★100mg/10mL リツキシマフBS注	90 ml 100 mg /Body		時間未定	
	9	DIV 点滴静注(サーフロー) 生理食塩液注 500mL メインルート	1 袋		時間未定	
	10	SC 皮下注射 ジラスス皮下注3.6mg/0.36mL	1 シリンジ			時間未定
処方						
コメント		VCRをVDSへ変更可 VCR Max 2mg/body PSL 100mg/m ² × 5日間が原法も 適宜調整可				