

免疫血液内科 非ホジキンリンパ腫 NHL THP-COP-R 1dayレジメン外来(2023/2～)

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) ① パックラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイトル) ★オルカトロン注 3.8mg/1mL	1袋 1A		時間未定
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) 生理食塩液注 100mL ★500mg エンドキサン注 1時間で投与	1瓶 650 mg /m ²		時間未定
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) 生理食塩液注 100mL ★テラルピシン注 10mg 1時間で投与	1瓶 40 mg /m ²		時間未定
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 生理食塩液注 50mL ★オンベジン注 1mg 全開	1瓶 1 mg /m ²		時間未定
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) 生理食塩液注 100mL ★ハイドロコトロン注 100mg/2ml ボララミン注 5mg/1mL リツキサン前投薬	1瓶 1瓶 1A		時間未定
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) 生理食塩液注 500mL 後)★500mg/50mL リツキシマフ [®] BS注	450 ml 500 mg /Body		時間未定
	7	DIV 点滴静注(サーフロー) 生理食塩液注 100mL 後)★100mg/10mL リツキシマフ [®] BS注	90 ml 100 mg /Body		時間未定
	8	DIV 点滴静注(サーフロー) 生理食塩液注 100mL 後)★100mg/10mL リツキシマフ [®] BS注	90 ml 100 mg /Body		時間未定
	9	DIV 点滴静注(サーフロー) 生理食塩液注 500mL メインルート	1袋		時間未定
	10	SC 皮下注射 ホディーポット [®] シーラス [®] 皮下注3.6mg/0.36mL	1キット		時間未定
処方					
コメント		VCRをVDSへ変更可 VCR Max 2mg/body PSL 100mg/m ² X 5日間が原法も 適宜調整可			