

免疫血液内科 非ホジキンリンパ腫 pola + Benda療法(2021/12～)

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) 30 分で ホララシ注 5mg/1mL ★ハイドロコートン注 100mg/2ml 生理食塩液注 100mL	1 A 1 瓶 1 瓶		時間未定		
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) 初回90分、忍容性良好なら30分まで短縮 フィルター必要 要時)★30mg ホラ化点点滴静注用	1.8 mg /kg 1 A 1 瓶		時間未定		
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) 30 分で パロ/セトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タイボウ」 ★オルカトロン注 3.8mg/1mL	1 袋 1 A		時間未定		
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) 30 分で ★オルカトロン注 3.8mg/1mL 生理食塩液注 100mL	1 A 1 瓶		時間未定		
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) 60 分で 要時)★トリアキソ点滴静注液 100mg/4mL 生理食塩液注 250mL	90 mg /m <sup>2</sup> 1 袋		時間未定	時間未定	
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定	時間未定	
	処方						
	コメント	ポライビーは体重40kg以下で輸液考慮(希釈後の濃度:0.72mg/mL～2.7mg/mL)					