

免疫血液内科 非ホジキンリンパ腫 pola+CHP 1-6コース

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(3)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		① 30 分で ボラリン注 5mg/1mL	1 A			
		★ハイドロコトロン注 100mg/2ml	1 瓶			
		生理食塩液注 100mL	1 瓶			
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		② フィルター必要 初回90分、忍容性良好なら30分まで短縮				
		要時)★30mg ボラリン点静注用	1.8 mg /kg			
		注射用蒸留水 20mL	1 A			
		生理食塩液注 100mL	1 瓶			
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		③ 30 分で バックグラセロン点静注 3mg/100mL(カイトル)	1 袋			
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		④ 1 時間で 生理食塩液注 100mL	1 瓶			
		★500mg エンドキサン注	750 mg /m <sup>2</sup>			
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		⑤ 1 時間で 生理食塩液注 100mL	1 瓶			
		★10mg アドリアシン注	50 mg /m <sup>2</sup>			
	6	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		メイン ソルテム3A輸液 500mL	1 袋			
	7	SC 皮下注射				時間未定
		ジラスタ皮下注3.6mg/0.36mL	1 シリンジ			
処方						
コメント		PSL 100mg/m <sup>2</sup> X 5日間は原法も 適宜調整可				