

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(3)
注射	✂					
	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		①				
		後・バック)グラネセロン点滴静注 3mg/100mL(カイト)	1 袋			
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	1 A			
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		生理食塩液注 100mL	1 瓶			
		★揮)100mg エンドキサン注	750 mg /m <sup>2</sup>			
		1時間で投与				
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		生理食塩液注 100mL	1 瓶			
		★10mg アドリアシン注	50 mg /m <sup>2</sup>			
	1時間で投与					
4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
	②					
	フィルター禁忌					
	生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	★オンコビン注 1mg	1 mg /m <sup>2</sup>				
	全開					
5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
	後)フルデム3A輸液 500mL	1 袋				
	メイン					
6	SC 皮下注射				時間未定	
	ジーラスタ皮下注 3.6mg/0.36mL	1 シリンジ				
処方						
コメント		VCRをVDSへ変更可 VCR Max 2mg/body				
		PSL 100mg/m <sup>2</sup> × 5日間が原法も 適宜調整可				