

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(3)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) ①			時間未定	
		後・バック)グラネセロン点滴静注 3mg/100mL(カイト)	1袋			
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	1A			
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		生理食塩液注 100mL	1瓶			
		★揮)100mg エンドキサン注 1時間で投与	650 mg /m ²			
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		生理食塩液注 100mL	1瓶			
		★テラルピシン注 10mg 1時間で投与	40 mg /m ²			
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ②			時間未定	
		フィルター禁忌 生理食塩液注 50mL	1瓶			
		★オンコビン注 1mg 全開	1 mg /m ²			
5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
	後)ソルデム3A輸液 500mL メイン	1袋				
6	SC 皮下注射				時間未定	
	ジースタ皮下注 3.6mg/0.36mL	1シリンジ				
処方						
コメント		VCRをVDSへ変更可 VCR Max 2mg/body				
		PSL 100mg/m ² × 5日間が原法も 適宜調整可				