

産婦人科 dose dense TC (PTX+CBDCA)

| 分類 | GpNo | 薬剤/手技 | 投与量 | 点滴時間・速度 | day(1) | day(8) | day(15) | |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------|--------|---------|--|
| 注射 | 1 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | 時間未定 | | | |
| | | ① 15 分で ★オルカトロン注 3.8mg/1mL フモチジン注射液 20mg/2mL「トワ」(カスター) ホラミン注 5mg/1mL 生理食塩液注 100mL | 2 A 1 A 1 A 1 瓶 | | | | | |
| | 2 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | 時間未定 | | | |
| | | ② 30 分で バックウケラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル) | 1 袋 | | | | | |
| | 3 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | 時間未定 | | | |
| | | ③ 60 分で フィルター必要 ★30mg/5mL ハウタキセル注「ホスピール」 5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26～) | 80 mg /m ² 1 袋 | | | | | |
| | 4 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | 時間未定 | | | |
| | | ④ 60 分で 後)★50mg/5mL カルボプラチン注 5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26～) | 6 mg /GFR+25 1 袋 | | | | | |
| | 5 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | 時間未定 | | | |
| | | ⑤ 全開で 生理食塩液注 50mL | 1 瓶 | | | | | |
| | 6 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | | 時間未定 | 時間未定 | |
| | | ① 15 分で ★オルカトロン注 3.8mg/1mL フモチジン注射液 20mg/2mL「トワ」(カスター) ホラミン注 5mg/1mL 生理食塩液注 100mL | 2 A 1 A 1 A 1 瓶 | | | | | |
| | 7 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | | 時間未定 | 時間未定 | |
| | | ② 30 分で バックウケラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル) | 1 袋 | | | | | |
| | 8 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | | 時間未定 | 時間未定 | |
| | | ③ 60 分で フィルター必要 ★30mg/5mL ハウタキセル注「ホスピール」 5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26～) | 80 mg /m ² 1 袋 | | | | | |
| | 9 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | | 時間未定 | 時間未定 | |
| | | ④ 全開で 生理食塩液注 50mL | 1 瓶 | | | | | |
| | 処方 コメント | | | | | | | |