

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定
		① 30 分で			
		★オルカトロン注 3.8mg/1mL	2 A		
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶		
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定
		② 90 分で フィルター禁忌			
		★ドキシル注 20mg/10mL	40 mg /m ²		
		5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~)	1 袋		
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定
		③ 全開で			
		5% ブドウ糖注 50mL	1 瓶		
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定
		④ アバステン前後フラッシュ			
		生理食塩液注 100mL	1 瓶		
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定
	⑤ 全量で100mlとなるよう調整 初回90分、2回目60分、3回目以降30分で				
	★100mg/4mL アバステン注	15 mg /kg			
	生理食塩液注 100mL	1 瓶			
処方					
コピ外		投与量が90mg未満→5%Tz250mlで希釈、90mg以上→5%Tz500mlで希釈			
		総投与量 > 500mg/m ² で心毒性発現の可能性あり			
		縦隔放射線治療既往やCPA併用では > 400mg/m ² で心毒性発現の可能性あり			