

## 産婦人科 GD (GEM+DTX)

| 分類         | GpNo. | 薬剤／手技  | 投与量                    | 点滴時間・速度 | day(1) | day(8) |
|------------|-------|--|------------------------|---------|--------|--------|
| 注射         | 1     | DIV 点滴静注(サーフロー)<br>①<br>30 分で<br>パック)カラニセトロン点滴静注<br>3mg/100mL(カイトリル) | 1 袋                    |         | 時間未定   |        |
|            | 2     | DIV 点滴静注(サーフロー)<br>②<br>30 分で<br>★ 200mg ジュムザール注                     | 800 mg /m <sup>2</sup> |         | 時間未定   |        |
|            |       | 5% ブドウ糖注 100mL   | 1 瓶                    |         |        |        |
|            | 3     | DIV 点滴静注(サーフロー)<br>③<br>全開で<br>生理食塩液注 50mL                           | 1 瓶                    |         | 時間未定   |        |
|            | 4     | DIV 点滴静注(サーフロー)<br>①<br>30 分で<br>パック)カラニセトロン点滴静注<br>3mg/100mL(カイトリル) | 1 袋                    |         | 時間未定   |        |
|            | 5     | DIV 点滴静注(サーフロー)<br>②<br>60 分で<br>★20mg/1mL ドセタキセル点滴静注「ニフロ」           | 70 mg /m <sup>2</sup>  |         | 時間未定   |        |
|            | 6     | DIV 点滴静注(サーフロー)<br>③<br>30 分で<br>★ 200mg ジュムザール注                     | 800 mg /m <sup>2</sup> |         | 時間未定   |        |
| 処方<br>コメント | 7     | DIV 点滴静注(サーフロー)<br>④<br>全開で<br>生理食塩液注 50mL                           | 1 瓶                    |         | 時間未定   |        |