

産婦人科 triweekly TC (PTX+CBDCA)

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定
		① 15 分で			
		★オルカトロン注 3.8mg/1mL	3 A		
		ファミシリン注射液 20mg/2mL「トーワ」(カスター)	1 A		
		ホウラミン注 5mg/1mL	1 A		
		生理食塩液注 100mL	1 瓶		
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定
		② 30 分で			
		バックグラニセロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋		
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定
		③ 3 時間で フィルター必要			
		★30mg/5mL ハウリタキセル注「ホスピーラ」	175 mg /m ²		
		生理食塩液注 500mL	1 袋		
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定
		④ 1 時間で			
	後)★50mg/5mL カルボフラーチン注	6 mg /GFR+25			
	5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~)	1 袋			
5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
	⑤ 全開で				
	生理食塩液注 50mL	1 瓶			
処方					
コメント					