

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)	
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	時間未定	時間未定	
		① 15分で						
		ボラリン注 5mg/1mL	1 A					
		★オルガトロン注 3.8mg/1mL	2 A					
		ファミシジン注射液 20mg/2mL「トロー」(カスター)	1 A					
		生理食塩液注 50mL	1 瓶					
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	時間未定	時間未定
		② 30分で						
		バックグラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋					
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	時間未定	時間未定
		③ 60分で フィルター必要						
		★30mg/5mL パクリタキセル注「ホスピール」	80 mg /m <sup>2</sup>					
		5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~)	1 袋					
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定		
		④ アバスチン前後フラッシュ						
		生理食塩液注 100mL	1 瓶					
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定		
		⑤ 全量で100mlとなるよう調整 初回90分、2回目60分、3回目以降30分で						
	★100mg/4mL アバスチン注	15 mg /kg						
	生理食塩液注 100mL	1 瓶						
6	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定	時間未定	
	④ 全開で							
	生理食塩液注 50mL	1 瓶						
処方								
コメント								