$\mathbf{BEP} \ (\mathbf{BLM} + \mathbf{VP16} + \mathbf{CDDP}) \quad 1/2$

分類	GpNα	薬剤/手技	投与量	点滴時間·速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(9)	day(16)
	<i>y</i>	DD (F) OFFS (III)			******						
	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定						
		① 120分で									
		生理食塩液注 500mL	1袋								
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	2 A								
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定						
		Ø 30 分で									
		後・バック")ケブラニセトロン点流 高 静注 3mg/100mL(カイトリ	1 🛱								
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定						
		③ 120分で 全量で500mLとなるように調製									
			00 (-2								
		婦人科)★10mg/20mL ランダ注 生理食塩液注 500mL	20 mg /m² 1 45%								
注射	4	DIV 点滴静注(サーフロー)	1 200		時間未定						
					SANCIBILINE						
		④ 120分で									
		後)★エトポシド注 100mg/5mL	100 mg /m²								
	5	生理食塩液注 500mL DIV 点滴静注(サーフロー)	1袋		時間未定						
	Ü	(S)			时间不足						
		120分で									
		後)ソルデム3A輸液 500mL	1袋								
	6	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定					
		● 120分で									
		生理食塩液注 500mL	1 🛱								
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1st	2 A								
	7	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定					
		Ø 30 分で									
		後・バックプクラニセトロン点: 滴請 注 3mg/100ml/th/kil	1袋								
	8	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定					
		③ 120分で 全量で500mLとなるように調製									
			20 mg /m²								
		婦人科)★10mg/20mL ランダ注 生理食塩液注 500mL	1袋								
	9	DIV 点滴静注(サーフロー)	1 20			時間未定					
		● 120分で									
			400 (0								
		後)★エトポシド注 100mg/5mL 生理食塩液注 500mL	100 mg /m² 1 ⊈Ş								
	10	DIV 点滴静注(サーフロー)	1 270			時間未定					
	10					WINDS AND					
		⑤ 30 分で	/ 0								
		★ブレオ注 5mg 生理食塩液注 100mL	20 mg /m² 1 瓶								
	11	生理良温液法 100mL DIV 点滴静注(サーフロー)	+ πB.			時間未定					
	-	®									
3+a4		120分で									
注射	10	後)ソルデム3A輸液 500mL	1袋				0.488.4.4	048944	0.489.4.4		
	12	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定	時間未定	時間未定		
		の 120分で									
		生理食塩液注 500mL	1袋								
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	2 A				-+				
	13	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定	時間未定	時間未定		
		Ø 30 分で									
		後・バッケッケッケラニセトロン点流語動主 3mg/100mL(カイトリ	1 45								

産婦人科

BEP (BLM+VP16+CDDP) 2/2

強	GpNα	薬剤/手技	投与量	点滴時間·速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(9)	day(16)
	14	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定	時間未定	時間未定		
		③ 120分で 全量で500mLとなるように調製									
		婦人科)★10mg/20mL ランダ注	20 mg /m²								
		生理食塩液注 500mL	1袋								
	15	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定	時間未定	時間未定		
		④ 120分で									
		後)★エトポシド注 100mg/5mL	100 mg /m²								
		生理食塩液注 500mL	1 💢								
-	16	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定	時間未定	時間未定		
討		⑤ 120分で									
		後)ソルデム3A輸液 500mL	1袋								
	17	DIV 点滴静注(サーフロー)								時間未定	時間未知
		の 30 分で									
		後・バッケッケッケラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリ	1袋								
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ffl	2 A								
	18	DIV 点滴静注(サーフロー)								時間未定	時間未知
		Ø 30 分で									
		★ブレオ注 5mg	20 mg /m²								
		生理食塩液注 100mL	1瓶								
	19	DIV 点滴静注(サーフロー)								時間未定	時間未足
		③ 全開で									
		生理食塩液注 50mL	1瓶								
5											