

耳鼻咽喉科 CBDCA+CPT(2021/11~)

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)
	1	DIV 点滴静注(サーフロー) 持続点滴、メインルート 50 mL/時 200mL ソルテム3A輸液	1袋		時間未定	
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) ① 30 分で ★オルガトロン注 3.8mg/1mL パック)グラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	2 A 1袋		時間未定	
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 60 分で 5%トウ糖注 250mL(袋)(10/26~) ★40mg/2mL イリノケン注「ホスピーラ」	1袋 60 mg /m ²		時間未定	
注射	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ③ 60 分で 5%トウ糖注 250mL(袋)(10/26~) 後)★50mg/5mL カルボフラチソ注	1袋 6 mg /GFR+25		時間未定	
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) 持続点滴、メインルート 50 mL/時 生理食塩液注 100mL	1瓶		時間未定	
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) ① 30 分で 5% ブドウ糖注 100mL ★オルガトロン注 3.8mg/1mL プリンベラン注 10mg/2mL	1瓶 1 A 1 A		時間未定	
	7	DIV 点滴静注(サーフロー) ③ 60 分で 5%トウ糖注 250mL(袋)(10/26~) ★40mg/2mL イリノケン注「ホスピーラ」	1袋 60 mg /m ²		時間未定	
処方 コメント						